

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

## 胃痛・胃もたれ・むかつきにスクラト胃腸薬S(錠剤)

### こんな方に効きます



胃の痛み



胃もたれ



むかつき



胸やけ

胃の中が空っぽの  
**空腹時・睡眠中**にも効く  
胃痛のもとに直接効く  
「患部修復機能」胃腸薬

#### ○胃痛のもと(荒れた患部)を保護・修復します

スクラルファートが胃の荒れた患部を選んで吸着し、胃酸などの攻撃から保護するとともに、患部を修復して、もとから治していきます。

#### ○健胃生薬が弱った胃を回復します

7つの健胃生薬が胃の働きを高め、弱った胃をじっくり回復させて、元気な胃にしています。

#### ○消化酵素が弱った胃の働きを助けます

脂肪を分解するリパーゼAP12と、でんぷんを分解するビオヂアスターゼ2000が、効果的に消化を助けます。

#### ○すばやく、かつ持続的に胃酸を中和します

炭酸水素ナトリウムと合成ヒドロタルサイトが症状のもととなる胃酸をすばやくかつ持続的に中和し、胃への刺激・負担を軽減します。

### ⚠ 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

##### 1. 次の人は服用しないでください

透析療法を受けている人。

##### 2. 長期連用しないでください



#### 相談すること

##### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 高齢者。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 次の診断を受けた人。

腎臓病

##### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |

##### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘

##### 4. 2週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(必ず裏面もお読みください)

## 効 能

胃痛、もたれ(胃もたれ)、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、胸やけ、胃酸過多、げっぷ(おくび)、胃重、胃部膨満感、胃部不快感、胸つかえ、食べ過ぎ(過食)、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振(食欲減退)、飲み過ぎ(過飲)、嘔吐

## 用法・用量

次の量を食間\*・就寝前又は食後に服用してください。

\*食間とは、食後2～3時間経過し、胃の中に食べ物がほぼなくなっている時です。

| 年 齢       | 1回量         | 1日服用回数 |
|-----------|-------------|--------|
| 成人(15才以上) | 3錠          | 3回     |
| 15才未満     | ×服用しないでください |        |

〈用法・用量に関連する注意〉用法・用量を厳守してください。

## 成 分 1日服用量(9錠)中

上・下層(淡褐色)

- ・スクラルファート水和物…574.05mg
- ・炭酸水素ナトリウム ……600mg
- ・合成ヒドロタルサイト ……480mg
- ・健胃生薬末 ……702mg

- ・ウイキョウ ……60mg
- ・ウコン ……60mg
- ・ケイヒ ……300mg
- ・ゲンチアナ ……30mg
- ・サンショウ ……12mg
- ・ショウキョウ ……120mg
- ・チョウジ ……120mg



3層錠

中層(白色)

- ・スクラルファート水和物…925.95mg
- ・ビオチン ……30mg
- ・リパーゼAP12 ……30mg

添加物として、  
D-マンニトール、L-メントール、マクロゴール、カルボキシメチルスターチNa、セルロース、硬化油、二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、香料を含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤には生薬末(生薬:薬用の草根木皮)が配合されていますので、製品により色が多少異なることがあります。また、生薬末は7つの生薬を凍結粉碎したものです。製品によっては生薬の繊維が目につくことがあります。どちらの場合も品質・効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## お問合せ先

スクラート胃腸薬S(錠剤)についてのお問合せは、お買い求めのお店又は下記のお客センターまでご連絡ください。

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)