

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## ストoppaエル下痢止めEX

第2類医薬品

おなかが痛いときの下痢に水なし1錠で効きます。

口の中で溶かし、水なしでのめるため、外出時など場所を選ばずにのむことができます。

～さらに速く溶けるようになりました～



冷え



会議・試験



旅行・外出中

下痢の「原因」はさまざまです。

- ・生理痛に伴う下痢
- ・冷えからくる下痢
- ・水あたり
- ・飲みすぎによる下痢

### 〈すぐれた効きめ〉

生薬ジャクワクエキス…おなかが痛いときの下痢に効果を発揮します。 ロートエキス(生薬ロートコンから抽出)…腸の異常収縮を抑え、腸内での便の移行スピードを抑えます。

タンニン酸ペルペリン…腸粘膜の炎症を抑えとともに下痢の原因菌を殺菌し、食あたり・水あたり等の下痢に効果を発揮します。



### 〈どこでものめる〉

口の中でふわっと溶けるストppa。水なしでサツとのめるから、どんなシーンでも服用できます。

爽やかなアップル味



## △ 使用上の注意

**× してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
  - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。  
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。)
  - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (5) 高齢者。
  - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (7) 次の症状のある人。  
排尿困難
  - (8) 次の診断を受けた人。  
心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状           |
|-------|---------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 精神神経系 | 頭 痛           |
| 泌尿器   | 排尿困難          |
| その他   | 顔のほてり、異常なまぶしさ |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**その他の注意** 母乳が出にくくなることがあります。

(必ず裏面もお読みください)

## 効 能

腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便

## 用法・用量

次の量を噛みくだくか、口の中で溶かして服用してください。

| 年 齢       | 1 回 量       | 1日服用回数   | 服用間隔     |
|-----------|-------------|----------|----------|
| 成人(15才以上) | 1錠          | 3回を限度とする | 4時間以上あける |
| 15才未満     | ×服用しないでください |          |          |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTP(包装)シートの凸部を指先で強く押し  
て裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください(誤ってそのまま飲  
み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 成 分 1回服用量(1錠)中

| 有効成分                         | 含量    | はたらき                                                     |
|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| ロートエキス3倍散<br>(ロートエキスとして20mg) | 60mg  | 腸の異常収縮を抑え、腸内での便の移行スピードを抑制します。<br>腹痛を伴うような下痢に高い効果を発揮します。  |
| タンニン酸ベルベリン                   | 100mg | 腸粘膜を保護するとともに炎症を抑え、腸内の水分が過多になるのを防ぎます。また、腸内の異常な腐敗、醗酵を抑えます。 |
| シャクヤク乾燥エキス<br>(原生薬換算量168mg)  | 24mg  | 腹痛を伴う下痢の痛みを和らげる効果があります。                                  |

添加物として、D-マンニトール、セルロース、クロスポリビドン、トウモロコシデンプン、デキストリン、無水ク  
イ酸、ステアリン酸Mg、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、L-メントール、香料を含有します。

### 〈成分に関連する注意〉

生薬(薬用の草根木皮など)を用いた製品ですから、製品により錠剤の色調や味が多少異なつた  
り、黒い斑点が見えることがありますが、効果には変わりありません。

**<錠剤が黄色い理由>** ストッパエル下痢止めEXに配合されている「タンニン酸ベルベリン」  
が黄色い成分のためであり、着色料は配合していません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 変質の原因となりますので、錠剤の入っているPTP(包装)シートをミシン目に沿って切り離  
す際などに、服用なさらない錠剤の裏のアルミ箔に傷をつけないようにしてください。

## お問合せ先

ストッパエル下痢止めEXについてのお問合せは、お買い求めのお店又は下記のお客センター  
までご連絡ください。

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ブランドサイト <http://stoppa.lion.co.jp/>

**ライオン株式会社**  
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7