

サロンパス®

第3類医薬品

経皮鎮痛消炎剤
販売名:
サロンパス®
ローション

ここを
押し開けて
ください。

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

特長

- 有効成分サリチル酸グリコールにより肩こり、筋肉痛にすぐれた効果を発揮します。
- スッと心地よいサロンパスの刺激がコリをほぐします（爽快刺激感処方）。
- “らく塗り”ボトル採用で塗りにくい部位にも楽に塗布できます。
- 微香性なので外出先でも安心してご使用いただけます。

・塗布した後、運動などをしますと、強い刺激(ヒリヒリ感)を感じる事があります。刺激が強すぎる時は使用を中止してください。石けんで洗い流すと刺激は緩和します。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、ただれ、傷口、化膿部位。

☒ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

火気厳禁

第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ(エタノール、プロピレングリコール)

成分・分量

100g中に次の成分を含んでいます。
サリチル酸グリコール……3.0g
ノナ酸バニリルアミド……0.015g
ニコチン酸ベンジルエステル……0.02g
グリチルレチン酸……0.05g
l-メントール……………5.0g
添加物として、エタノール、プロピレングリコールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光を避け、キャップをしっかりと閉めて涼しい所(冷暗所)に立てて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり、品質が変わることがあります)。
- (4)火気には近づけないでください。
- (5)時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしてある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6)衣類に付着した場合には、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (7)使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。

発売元 久光製薬株式会社
〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

久光製薬お客様相談室 :
☎ 0120-133250
受付時間 :
9:00~12:00, 13:00~17:50
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

製造販売元
ジャパン メディック 株式会社
〒931-8412 富山県富山市横越168

4 987188 155059
3912HJ

hisamitsu

心地よいサロンパスの刺激が コリをほぐす

肩こり・筋肉痛に

サロンパス®
ローション 85mL

第3類医薬品



微香性

効能・効果

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉疲労、筋肉痛、打撲、ねんざ、骨折痛、しあわせ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

《用法・用量に関する注意》

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)入浴前後の使用は避けてください。
- (7)入浴等で肌をこすったり、夏場など汗をかいた時は、本剤による刺激を強く感じる場合があります。激しい痛みや刺激感やかゆみを感じた場合には、使用を中止し、こすらないでやさしくなでるように患部をよく泡立てた石けんと水で数回洗った後、患部を冷水や軽くしぼったぬれタオルなどで十分に冷やしてください。症状の改善がみられない場合は、この箱を持ちて医師に相談してください。
- (8)塗布した患部をコツツや電気毛布で温めないでください。
- (9)皮膚の弱い人は、同じ所に続けて塗布しないでください。
- (10)本剤を塗った後の患部を通気性の悪いものでおおわないでください。
- (11)スポンジに薬液を十分しみこませてから患部に塗布してください。薬液をスポンジ面ににじませないで使用すると、スポンジが破損する場合があります。



医薬品
販賣

販賣