

しみなくてソフトな目ぐすり こどもロビンアイA

商品の特長

戸外での遊びやスポーツ、水泳などでお子様の目はゴミやほこりにさらされやすく、目のかゆみや充血などを起こしがちです。

また、最近では、長時間のテレビゲーム・テレビ・勉強などからくる疲れ目も多く見られます。こどもロビンアイAは、お子様のデリケートな体質を考慮した、しみないソフトなさし心地で、目のかゆみ・充血を鎮め、眼病を予防できます。

⚠️【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人……はげしい目の痛み。
- (5) 次の診断を受けた人……緑内障。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみ改善されない場合。
- (3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

～こんな時、こどもロビンアイAをさしてあげてください～



●水泳のあとの眼病予防に



●テレビゲームのあとの疲れ目に



●花粉などによる目のかゆみ・充血に

【効能・効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法・用量】 1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先が、まぶたやまつ毛に触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染又は混濁することがあるので、触れないよう目から少し離して使用してください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 本剤は点眼剤です。点眼の目的以外には使用しないでください。

【成分・分量】

有効成分	含量 (10mL中)	はたらき
グリチルリチン酸二カリウム	8mg	目のかゆみ・疲れ・まぶたのただれなどの症状を起こした目の各種組織の消炎・修復に有効です。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	1mg	抗ヒスタミン剤の一つで、目のかゆみ、流涙などの症状をやわらげます。
タウリン	10mg	アミノ酸の一種で、目に栄養を与え疲れの回復を早めます。

添加物として、クロロブタノール、バラベン、ホウ砂、ホウ酸を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は、できるだけ速やかに使用してください。開封後、長く放置すると濁りや変質のおそれがあるので、注意してください。

《包 装》 10mL

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

久光製薬お客様相談室： ☎ 0120-133250 受付時間： 9:00～12:00、13:00～17:50 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **佐賀製薬株式会社** 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481