

のりもの酔いに こどもクールスカイ[®] 鎮暈薬 〈内服液〉

商品の特長

- こどもクールスカイは、お子様用ののりもの酔い予防・治療薬です。液剤なので有効成分が早く吸収され、めまい、はきけ、頭痛などの不快な症状に効果をあらわします。

⚠️[使用上の注意]

❌してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他ののりもの酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）。

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人：排尿困難。
- (7) 次の診断を受けた人：緑内障、心臓病。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
循環器	動悸
その他	顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

口のかわき、便秘。

【効能・効果】 のりもの酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

【用法・用量】 3～14才、1回1本(20mL)を服用してください。

のりもの酔いの予防には乗車船30分前に1回1本を服用します。なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回1本を4時間以上の間隔をおいて服用してください。1日の服用回数は2回を限度とします。3才未満の乳幼児には服用させないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

有効成分	含量(40mL,2本中)	はたらき
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.667mg	はきけ、めまいをおさえます。
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.167mg	はきけ、めまいをおさえます。
無水カフェイン	25mg	頭痛を軽くします。

添加物として、安息香酸Na、エタノール、クエン酸、グリセリン、香料、D-ソルビトール、白糖、プロピレングリコールを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

～ のりもの酔いをさけるための注意 ～
のりもの酔いをさけるために、次の点にも注意してください。



● のりものに乗る前夜は睡眠を十分にとりましょう。

● 揺れが少ない前方の席や窓際の席を選びましょう。

● おしゃべりで気分を楽にしましょう。

● 飲み過ぎ食べ過ぎは避けましょう。

《包装》 20mL×2本

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

久光製薬お客様相談室：☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **田村薬品工業株式会社** 〒639-2295 奈良県御所市西寺田50