

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときにはすぐ読めるよう大切に保管してください。

水虫・たむし治療薬 ブテナフィン塩酸塩配合

第②類医薬品

ブテナロック[®]Vα 变快パウダー

目立たないパウダーでグジュグジュ水虫のかゆみを伴う症状を抑えます!!
マイクロパウダーのトリプル処方でサラサラ感長時間持続。
患部にピンポイント噴射できる「ジェット式」なので、直接手を触れることなく簡単・
清潔に使用できます。

△使用上の注意

☒してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。

本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください。

(1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。

(2)湿疹。(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)乳幼児。(4)本人又は家族がアレルギー体质の人。(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6)患部が広範囲の人。(7)患部が化膿している人。(8)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、水疱、亀裂

(2)2週間位使用しても症状がよくならない場合、又、本剤の使用により症状が悪化した場合。

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日1回、適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4)外用にのみ使用してください。

(5) 使用に際しては、本人及び周囲の人も吸入しないよう注意してください。(6) 使用前によく振ってください。(7) 患部より約10cmの距離で噴射してください。(8) 同じ箇所に連続して3秒以上噴射しないでください。(9) 「正立」又は「倒立」でご使用ください。(10) 横向きで使用するとガスが先に出て最後まで使用できない場合があります。



成分・分量

原液 1mL中	ブテナфин塩酸塩	10mg	<i>l</i> -メントール	20mg
	ジブカイン塩酸塩	2mg	クロタミトン	10mg
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg	イソプロピルメチルフェノール	3mg
	グリチルレチン酸	2mg		

添加物として、イソプロパノール、エタノール、ジエタノールアミン、タルク、トウモロコシデンプン、二酸化ケイ素、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル、DMEを含有します。

〈成分に関する注意〉アルコールを含んでいますので、塗布時にしみることがあります。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしめて保管してください。
 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。(5) 火気に近づけたり、火の中に入れたりしないでください。また、使用済みの容器は火中に投げないでください。(6) 合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがあるので、床や家具などにつかないようにしてください。(7) 火花が出る所で使用しないでください。

ガス抜きキャップの注意事項と方法 / 分別廃棄の仕方

※下図は商品の説明書です。サンプル品は構造が異なります。

- ①キャップの上部をはずし、平らな所に図の様に置きます。
- ②本体を逆さまにし、噴射口をキャップの受け口にあわせて置きます。
- ③本体を「カチッ」と音がするまで押し込み、噴射音が消えるまで放置します。
- ④噴射音が完全に消えてから「押しボタン」を引き抜きます。



- ⑤それぞれ市町村等で定められた方法により分別廃棄してください。

※必ず中身を使い切ってから、火気のない屋外でガス抜きを行ってください。

※ガス抜き中は、わずかに残った薬液がガスと共に噴き出しますので、顔を近づけないでください。

※本品のキャップ以外使用しないでください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。
 制造販売元 久光製薬株式会社 〒841-0017 烏栖市田代大官町408

お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

TEL 0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

(独)医薬品医療機器総合機構 TEL 0120-149-931

