

この説明文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、よくお読みください。


1日2回のコンタック(1回1カプセルで約12時間持続)

CONTAC®

コンタック®せき止め ST

せき・たんは、かぜなどののど、気管支の病気にともなっておこります。コンタックせき止め STはせきやたんにも効くように処方されています。非麻薬性鎮咳剤のデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物がせきをしずめ、リンチーム塩酸塩がたんを分解して出しやすくします。さらにジプロフィリンが収縮した気管支を広げて気道を確保することで、せきをしずめるとともに、たんを出しやすくします。コンタックせき止め STは徐放性顆粒の外側を速放性の層でおおった多重顆粒を充填したカプセル剤で、1回1カプセルの服用で約12時間効果があります。

〈模式図〉



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
- 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
 - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)次の症状のある人。
高熱
(5)次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、てんかん
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循環器	動悸
呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能】

せき、たん

【用法・用量】

下記の1回量を水又はお湯と一緒にかまずに服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	2回(朝・夕)
15歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

カプセルの取り出し方：図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強くおして裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分と作用】

2カプセル(1日量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	作 用
非麻薬性鎮咳剤	デキストロメトルファン 臭化水素酸塩水和物	60mg
気管支拡張剤	ジブプロフィリン	200mg
消炎酵素剤	リゾチーム塩酸塩	40mg (力価)

添加物：ゼラチン、タルク、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリル硫酸Na、エチルセルロース、オクチルデシルトリグリセライド、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、白糖、マクロゴール、無水ケイ酸

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

【お問い合わせ先】

- (1)購入した薬局・薬店
- (2)グラクソ・スミスクライン株式会社
コンシューマーヘルスケア事業本部 お客様相談室
【電 話】03-5786-6315 【受付時間】9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
- (3)上記以外の時間で、誤飲、誤用、過量使用等の緊急のお問い合わせは下記機関もご利用いただけます。
連絡先：(財)日本中毒情報センター 中毒110番
電 話：072-727-2499(24時間対応)

コンタックの他の製品情報やかぜと鼻炎に関する様々な情報は、PCや携帯電話から **contac.jp**へ

発 売 元：グラクソ・スミスクライン株式会社
製造販売元：エーザイ株式会社

東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目6番15号
東京都文京区小石川4-6-10

A33503-4LX