

この説明書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、よくお読みください。

アレルギー専用

1日2回のコンタック

CONTAC 600 FIRST®

コンタック600ファースト®

コンタック600ファーストは、ケチフェンマル酸塩(抗アレルギー薬)を配合。花粉、ハウスダストなどによるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりの緩和にすぐれた効果を発揮します。
 ● 抗アレルギー、抗ヒスタミン、抗炎症の3つの作用で症状を緩和します。
 ● 花粉症などによるくしゃみ・鼻みずなどの症状の始めから、1日2回の服用で効果を発揮します。



シーズン初期の
症状の始めに



抑えこむ
抗アレルギー作用



しずめてゆく
抗ヒスタミン作用



悪化を防ぐ
抗炎症作用

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - てんかん又はけいれん発作を起こしたことがある人。
 - 15歳未満の小児。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
 他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、
 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
 (眠気等があらわれることがあります。)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
 (動物試験で乳汁中への移行が認められています。)
- 服用前後は飲酒しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
 - 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
 - 次の症状のある人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 排尿困難
 - 高齢者。
 - 次の診断を受けた人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	紅斑、発疹、浮腫、かゆみ
鼻	鼻血
精神神経系	めまい、ふらつき、だるさ、頭痛、味覚異常、しびれ感、神経過敏、イライラ感、頭がボーっとする
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛、口内炎
泌尿器	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感
その他	動悸、ほてり、月経異常、体重増加

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
中枢神経症状	一過性の意識消失、けいれん、興奮等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 口のかわき、便秘、下痢、眠気、不眠
- 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 次の場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 症状の改善がみられても服用期間が2週間を超える場合

【効 能】

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり

【用法・用量】

下記の1回量を水又はお湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	2回(朝食後・就寝前)
15歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)花粉など季節性アレルギーによる鼻症状に使用する場合は、シーズン初期に症状が始めたら、つらくなる前の早めの服用が効果的です。
- (2)定められた用法・用量(必ず1回1カプセル、1日2回)を厳守してください。
- (3)1週間位服用しても症状がよくならない場合は、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(個人差等により薬の効果があらわれるまでに2週間位かかる場合もあります。)
- (4)カプセルの取り出し方:図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強くおして裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成 分】

2カプセル(1日量)中に次の成分を含んでいます。

ケトチフェンフマル酸塩 ……………2.76mg(ケトチフェンとして2mg)

添加物: D-マンニトール、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸Na

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

【お問い合わせ先】

- (1)購入した薬局・薬店
- (2)グラクソ・スミスクライン株式会社
コンシューマーヘルスケア事業本部 お客様相談室
【電 話】03-5786-6315
【受付時間】9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
- (3)上記以外の時間で、誤飲、誤用、過量使用等の緊急のお問い合わせは下記機関もご利用いただけます。
連絡先:(財)日本中毒情報センター 中毒110番
電 話:072-727-2499(24時間、365日対応)

コンタックの他の製品情報やかぜと鼻炎に関する様々な情報は、PCや携帯電話から contac.jp へ

発 売 元: **グラクソ・スミスクライン株式会社** 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目6番15号
製造販売元: **佐藤薬品工業株式会社** 奈良県橿原市観音寺町9番地の2