

日本薬局方

センナ

販売名 山本漢方センナ「分包」

【特徴】本品は生薬の煎じ薬、ティーバッグタイプ

△ 使用上の注意

❗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください

📞 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

効能又は効果

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常發酵、痔。

用法及び用量

大人(15歳以上)は、熱湯150mL～200mL中に1日量1包を入れ、とろ火で15分間煮た後に分包装を取り去り、なるべく就寝前に1回、煎液の1/2量～全量を服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら少しずつ増量又は減量してください。

〈注意〉

定められた用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量 1日量 1包(3.0g)中

成 分	分 量	作 用
日本薬局方 センナ	3.0g	大腸のぜん動運動を高め便通をうながします。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【内容量】288g(3g×96包)

【その他】

○つくり方(大人15歳以上)

土ビン又はヤカン(アルミ、ステンレス製)にてお湯150mL～200mLをつくり、その中へ1/2パックを入れ、最も小さな弱火にて、約15分間煮だしてください。(強火ですとこげつきが生じますので、上記のトロ火にて煮だしてください。)

○少々暖かいと、飲みやすくなります。

製造販売元

① 山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電 話 0568-73-3131

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日は除く)

http://www.kanpo-yamamoto.com