

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

下痢止め薬
水なしでものめる顆粒剤

セイドストップ

セイドストップは、突然の下痢や、痛みを伴う下痢にサツとのめる顆粒の下痢止め薬です。シナモン味でのみやすく、タンニン酸ペルベリン、ロートエキスに2種の止瀉、健胃生薬を加え、下痢、腹痛を伴う下痢によく効きます。

特長

- 水なしでもサツとのめるシナモン味の顆粒剤
- 下痢によく効く4つの成分を配合



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

胃腸鎮痛鎮痙薬

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
- (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることがあります。)
- (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (5) 高齢者。
- (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障

(右上下につづく)

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

成分 3包(3g)中

成分	分量	作用
タンニン酸ペルベリン	300mg	腸内の有害細菌を殺菌して腐敗・発酵を抑え、荒れた腸を整えます。
ロートエキス3倍散	180mg	腸液の分泌を抑え、過敏になった腸の運動と痛みを抑えます。
ゲンノショウコ乾燥エキス	100mg	荒れた腸を整え、下痢を抑えます。
ケイヒ末	100mg	芳香性のある健胃薬として用いられ、胃腸の働きを整えます。

添加物としてバレイショデンプン、エリスリトール、D-マンニトール、CMC-Ca、クロスボビドン、スクラロース、バニリンを含有する。

効能

下痢、腹痛を伴う下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便、食あたり、水あたり、はき下し

用法・用量

次の用量を服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1包	3回を限度とする
15才未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

(裏面につづく)

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

アラクスお客様相談室 ☎ 0120-225-081

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26

受付：9:00~16:30(土・日・祝日を除く)

製品情報をホームページでご覧ください。 www.arax.co.jp

ARAX 株式会社 アラクス
〒460-0002
名古屋市中区丸の内三丁目2-26