

この添付文書は、本剤の服用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



胃もたれ・むかつきに

# タナベ胃腸薬〈調律〉顆粒

第2類  
医薬品

「もたれる」「胃が重い」「ムカムカする」などの不快な症状は、“胃腸運動”の低下等が原因で引き起こされているのです。タナベ胃腸薬〈調律〉顆粒は、当社が開発した“胃腸運動”調律剤TM(トリメブチンマレイン酸塩)を配合した胃腸薬。弱った胃腸をイキイキ動かす外からのTM効果と、内からの効果(消化・制酸・粘膜修復)により、不快な症状を改善。外と内から効いて、スッキリさせる胃腸薬です。

■こんな方によく効きます。



もたれ



むかつき



膨満感



胸やけ



## 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。腎臓病、肝臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位  | 症 状           |
|-------|---------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 精神神経系 | 眠気、めまい、倦怠感、頭痛 |
| その他   | 動悸、口内しびれ感、腹鳴  |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状                                               |
|-------|---------------------------------------------------|
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

## 効 能

- ◎胃もたれ、胃部膨満感、胃重
- ◎はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき）、胃部不快感
- ◎食べすぎ、飲みすぎ、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感
- ◎食欲不振、胃弱、消化不良、胸つかえ
- ◎胃痛、胸やけ、胃酸過多、げっぷ、嘔吐

## 用法・用量

次の量を食後約30分以内に、水またはお湯で服用してください。

| 年齢        | 1回量        | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人（15才以上） | 1包         | 3回     |
| 15才未満     | 服用しないでください |        |

### ＜用法・用量に関連する注意＞

用法・用量を厳守してください。

## 成分（3包4.5g中）

| 成 分                     | 含 量   | はたらき         |
|-------------------------|-------|--------------|
| トリメブチンマレイン酸塩（TM）        | 300mg | 胃腸運動を整える     |
| ビオヂアスターゼ2000            | 120mg | 消化を助ける       |
| リパーゼAP6                 | 45mg  | 消化を助ける       |
| カンゾウ末                   | 150mg | 粘膜を修復し、保護する  |
| ロートエキス                  | 30mg  | 過剰な胃酸の分泌を抑える |
| 炭酸水素ナトリウム               | 300mg | 胃酸を中和する      |
| 沈降炭酸カルシウム               | 600mg | 胃酸を中和する      |
| メタケイ酸アルミン酸マグネシウム（乾燥物換算） | 240mg | 胃酸を中和する      |

添加物：D-マンニトール、カルメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ステアリン酸Ca、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセート、ℓ-メントール、セルロース、ハッカ油

## 保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- （4）使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。



製造販売元  
**田辺三菱製薬株式会社**  
大阪市中央区北浜2-6-18

ホームページ [www.mt-pharma.co.jp](http://www.mt-pharma.co.jp)

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店  
又は下記にお願いいたします。  
田辺三菱製薬「くすり相談センター」  
（フリーダイヤル ☎0120-54-7080）  
受付時間：弊社営業日の9:00～17:30

副作用被害救済制度の問合せ先 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
（独）医薬品医療機器総合機構 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

760801  
AB.Y 3-721050