

この添付文書は、本剤の服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



飲みすぎ・食べすぎに 第2類医薬品 新タナベ胃腸薬 顆粒

新タナベ胃腸薬顆粒は、二日酔のむかつきや近年の高蛋白質・多脂肪食に対応するための胃腸薬で制酸剤、消化酵素剤、利胆剤、健胃生薬及び粘膜修復剤を配合した灰白色・淡黄褐色・褐色の3種混合顆粒剤です。
服用によりすみやかに作用し、3種の制酸剤が胃内pHを整え、消化酵素をより働きやすくし、同時にデヒドロコール酸が胆汁の分泌を促進しますので、飲みすぎ・食べすぎ・はきけにすぐれた効果を発揮します。

■こんな方によく効きます。



飲みすぎ



食べすぎ



はきけ



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人。

2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の診断を受けた人。 腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢

4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能

- 飲みすぎ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
- 食べすぎ、消化促進、胃部・腹部膨満感
- 胸やけ、げっぷ(おくび)、胸つかえ、もたれ(胃もたれ)、胃酸過多
- 食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱
- 胃痛、胃重、胃部不快感

用法・用量

次の量を食後約30分以内に、水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
11才～14才	2／3包	
8才～10才	1／2包	
5才～7才	1／3包	
5才未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分(3包中)

成分	含量	はたらき
ビオチン	120mg	消化を助ける
リパーゼAP6	45mg	消化を助ける
デヒドロコロール酸	150mg	胆汁の分泌を促進する
ケイ酸アルミン酸マグネシウム(無水物として)	1080mg	胃酸を中和する
沈降炭酸カルシウム	300mg	胃酸を中和する
炭酸水素ナトリウム	600mg	胃酸を中和する
ニガキ末	150mg	胃の働きを助ける
ケイヒ末	135mg	胃の働きを助ける
ソウジュツ末	150mg	胃の働きを助ける
カンゾウ末	150mg	粘膜を修復し、保護する

添加物：D-マンニトール、カルメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、ポビドン、
ℓ-メントール、セルロース、二酸化ケイ素、ウイキョウ油、ハッカ油

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を
折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。



製造販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18

ホームページ www.mt-pharma.co.jp

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願いいたします。
田辺三菱製薬「くすり相談センター」
(フリーダイヤル ☎0120-54-7080)
受付時間：弊社営業日の9:00～17:30

副作用被害救済制度の問合せ先 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
(独)医薬品医療機器総合機構 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)