

△ご使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐、胸やけ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。 下痢
4. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

高コレステロール改善薬

スリムノールは、
高コレステロールの改善に
役立つお薬です。



コレステロールは体の細胞やホルモンのもととなる大切な成分ですが、必要以上に増えると血管の壁に蓄積するなど、体に悪い影響を与え「生活習慣病」の原因となることがあります。スリムノールの成分であるリポフラビン酪酸エステルは、コレステロールを減らす働きがあり、高コレステロールの改善に効果があります。

第3類医薬品

副作用救済制度 0120-149-931



リポフラビン酪酸エステル配合
高コレステロールの改善

高くなった
コレステロールを
正常値にもどしたい方に

A 浅田 飴

スリムノール

120錠

第3類医薬品

【効能・効果】

血清高コレステロールの改善

【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

年 齢	1 回量	服用回数
成人(15才以上)	2 錠	1 日 2 回
15才未満	服用しないこと	

- 定められた用法、用量を厳守してください。

【成分・分量】4錠中

成 分	分 量
リポフラビン酪酸エステル	60mg

添加物としてステアリン酸Mg、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク含有

- 本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これはリポフラビン酪酸エステルによるものでご心配ありません。
- 本剤に見られるわずかな赤い斑点は、有効成分をそのまま成形したことによるもので、品質には問題ありません。

発売元

A 株式会社 浅田 飴

東京都東村山市久米川町5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室

電話 03-3953-4044(ダイヤルイン)

時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168