

2012年1月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

第2類医薬品

シュガーレス〈オレンジ味〉

鎮咳去痰薬

浅田飴せきどめOG

⚠ ご使用上の注意

してはいけないこと



〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
（1）医師の治療を受けている人 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人 （3）授乳中の人 （4）高齢者 （5）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 （6）高熱のある人 （7）心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害の診断を受けた人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【用法・用量】

次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。
服用間隔は2時間以上おいてください。

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	3錠	1日6回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 18錠中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩	37.5mg	せきを鎮めます。
クレゾールスルホン酸カリウム	135mg	たんを出しやすくします。
セチルピリジニウム塩化物水和物	3mg	炎症を防ぎます。

添加物として還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸2K、アセスルファムK、コハク酸2Na、DL-リンゴ酸、アラビアゴム、カルナウバロウ、カラメル、D-ソルビトール、ポリソルベート80、L-メントール、タルク、サラシミツロウ、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、香料含有

【効能・効果】

せき、ぜんそく、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・
のどの痛み・のどのほれ

【保管及び取扱い上の注意】

- 5才未満の乳幼児の場合には、のどにつかえるおそれがありますので服用をさけてください。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変化します）。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

株式会社 浅田飴

東京都東村山市久米川町5-29-7
お問合せ先 03-3953-4044