

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

口腔内消炎薬

第3類医薬品

□内炎・のどの痛みに

トラフル[®]クイックショット[®]

こんな□内トラブル、ありませんか？

- ☒ しみて美味しく食事がとれない
- ☒ 痛くてしゃべるのがつらい
- ☒ 気になって仕事に集中できない



トラフル クイックショットは、抗炎症成分を配合。
患部に直接効いて、痛み・はれをしずめるスプレータイプの治療薬です。

- 炎症を起こした患部に直接作用し、痛み・はれをしずめる抗炎症成分
水溶性アズレンを配合
- の奥の患部にも使いやすいジェル状液のスプレータイプ
- すっきりメントール味

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 次の症状のある人
 - 内のひどいただれ
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
□	刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

■ 効能・効果

□内炎、
のどの炎症によるのどの痛み・のどのあれ・のどのはれ・のどの
不快感・声がれ

■ 用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布して下さい。


〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、のどの奥に使用する場合には、声を出しながら噴射して下さい。
- (2) 使用中、ノズルが□内にふれないようにして下さい。
- (3) 用法・用量を厳守して下さい。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (5) 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。

〔容器の使用方法〕

キャップをはずし、ノズルを患部に向けて
噴射して下さい。

なお、初回使用時は、薬液が出るまで
4～5回押して下さい。



成分・分量(100g中)

成 分	分 量	はたらき
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (水溶性アズレン)	20mg	粘膜に直接作用し炎症をしずめ、痛み・はれなどの症状を改善します。

添加物：L-メントール、ベンゼトニウム塩化物、グリセリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、エドト酸Na、ステビア抽出物、塩化Na、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップを閉めて保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
- (5) 衣服に付着した時は、水で洗い流して下さい。

口内炎について

口内炎は、口内(頬の内側や舌、唇の裏側など)の粘膜にできた小さな潰瘍を伴う炎症の総称です。原因は、噛んで粘膜を傷つけたり、栄養摂取の偏り、疲労、睡眠不足、ストレスなどさまざまです。患部がしみたり、痛みを感じるために、食事がとりづらい、しゃべりづらいなどのトラブルが起こりがちです。

口内炎予防 アドバイス

- 栄養バランスのとれた食事を心がける
- 夜更かしや不規則な生活をしないようにする
- ストレスや疲労をためないようにする
- アルコール、たばこ、刺激物をなるべく控える
- ガムや飴などで唾液を分泌させ、口の中の乾燥を防ぐ
- 食後は歯磨きをして口の中を清潔にする

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記をお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 03 (5205) 8331

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

03®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
東興薬品工業株式会社
富山県中新川郡立山町辻20