

マキロン® かゆみどめパッチP

第3類医薬品

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

【効能・効果】 虫さされ、かゆみ、しもやけ
【成分・分量】 本品の膏体100g (1.25m²) 中

マキロンかゆみどめパッチP

鎮痒消炎薬

⚠ 使用上の注意

❌【してはいけないこと】 (守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。
傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、かぶれ

🗨️【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、 刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	色素沈着

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

使用期限

製造番号

添加物：メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、I-メントール
貼付後ほてり(熱感)を感じることがありますが、ごく短時間のうちに消失します。

【使用法】 パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼って下さい。

【使用法に関連する注意】 (1) 使用法を厳守して下さい。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(3) 外用にのみ使用して下さい。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5) 同じ場所に長時間使用しないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になり品質が変わります) (4) 品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。 **【包装】** 36枚(直径2.0cm×36枚)

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931



4 987107 610591 E



Daiichi-Sankyo

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

救急薬品工業株式会社

富山県射水市戸破32-7



(お問い合わせ先)
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
電話 0120-337-936
受付時間 9:00～17:00(土、日、祭日も除く)
マキロンについて詳しくは www.makiron-s.jp ④登録商標