

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ビタミンEC主薬製剤

第3類医薬品

天然型ビタミンE・ビタミンC・ビタミンB₂・ビタミンB₆配合

ビトン-ハイ リッチ

ビトン-ハイ リッチの特徴

1. 主薬である天然型ビタミンEは、抗酸化作用により、血行に障害を与える過酸化脂質の生成をおさえ、血行を良くします。また、血液の流れをスムーズにして、肩・首すじのこり、手足の冷えやしびれを緩和します。
2. 主薬であるビタミンCは、皮膚や粘膜の正常なはたらきを助けるとともに抗酸化作用を持っています。肌のほりと潤いに必要なコラーゲンの生成に欠かせない成分であり、日やけ、しみの原因となるメラニン色素の沈着を防ぎます。
3. ビタミンB₂は、脂肪の代謝に関与し、エネルギー産生に欠かせない成分です。ビタミンE・Cのはたらきを助けます。
4. ビタミンB₆は、たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の正常なはたらきを助けます。
5. 3包(1包2g)中にビタミンC 2000mg、ビタミンE 300mgが含まれています。
6. 口の中ですぐに溶ける味の良い、シュガーフリー(砂糖を含まない)、ナトリウムフリー(塩分を含まない)の服用しやすい分包装粒剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘、下痢
4. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：
 - しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：
 - 肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の場合の出血予防：
 - 歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい」

- 次の場合のビタミンECの補給：
 - 肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

■ 用法・用量

次の量を服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	1～3回 ただし、1日2回服用する場合は 朝食及び夕食後、1日3回服用する 場合は毎食後服用して下さい。
11歳以上 15歳未満	2/3包	
7 歳以上 11歳未満	1/2包	
3 歳以上 7 歳未満	1/3包	
1 歳以上 3 歳未満	1/4包	
1 歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 1歳以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■ 成分・分量

本剤は、3包（1包2g）中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量
アスコルビン酸（ビタミンC）	2000mg
酢酸d-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）	300mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB ₂ 酪酸エステル）	12mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	15mg

添加物：還元麦芽糖水アメ、ヒドロキシプロピルセルロース、アセスルファムカリウム、タウマチン、レモン油、香料、トコフェロール

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。
- (2) 本剤に配合されているリボフラビン酪酸エステル（ビタミンB₂酪酸エステル）により、尿が黄色になることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 03 (5205) 8331

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

03

®登録商標：ビトン・ハイ及びリッチは第一三共ヘルスケアの登録商標です。



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
日野薬品工業株式会社
滋賀県蒲生郡日野町上野田119