

天然型ビタミンE・ビタミンC・ビタミンB<sub>2</sub>・ビタミンB<sub>6</sub>配合

第3類医薬品

# 新エバース<sup>®</sup>EC

シュガーフリー、ナトリウムフリー  
ビタミンEC主葉製剤

## 新エバースECの特徴

1. 主葉であるビタミンCは、しみの原因となるメラニンの生成をおさえ、コラーゲンの生成を助けるはたらきにより、しみ・そばかすなどの気になるお肌のトラブルを改善します。
2. 天然型ビタミンEを配合していますので、末梢の血行を改善し、新陳代謝をスムーズにして、出来てしまったシミの症状緩和につながります。また、同時に末梢血行を改善しますので、手足の冷えやしびれを緩和します。
3. 「お肌のビタミン」ビタミンB<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>のはたらきにより、お肌の新陳代謝を活性化し、細胞の生まれ変わりを促進しますので、お肌のトラブルの改善につながります。
4. 3包(1包2g)中にビタミンC2000mg、ビタミンE300mgが含まれています。
5. 口の中ですぐに溶ける味の良い、シュガーフリー(砂糖を含まない)、ナトリウムフリー(塩分を含まない)の服用しやすい分包顆粒剤です。



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

便秘、下痢

4. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効能・効果

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血  
「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい」
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

## 用法・用量

次の量を服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	1~3回
11歳以上15歳未満	2/3包	ただし、1日2回服用する場合は朝食及び夕食後、1日3回服用する場合は毎食後服用して下さい。
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上7歳未満	1/3包	
1歳以上3歳未満	1/4包	
1歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)1歳以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## 成 分・分 量

本剤は黄色の顆粒で、3包(1包2g)中に次の成分を含有しています。

アスコルビン酸(ビタミンC) ..... 2000mg  
酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール(天然型ビタミンE) ..... 300mg  
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステル) ..... 12mg  
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>) ..... 15mg

添加物：還元麦芽糖水アメ、ヒドロキシプロピルセルロース、アセスルファムカリウム、タウマチニン、レモン油、香料、トコフェロール

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1)本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。
- (2)本剤に配合されているリボフラビン酪酸エステル(ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステル)により、尿が黄色になることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 03(5205)8331

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標