

ひきはじめのかぜに

第2類医薬品

カコナル[®]2



感冒の
初期

鼻かぜ



頭痛

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

使用前にこの箱の説明文
書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう
大切に保管してください。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる。水泡が皮膚の赤い部分にあらわれる。高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

3. 1か月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

カコナル[®]2
45mL×2本

第2類医薬品

水製抽出液葛根湯

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかくていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

次の量を朝夕、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないでください。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は1回1本飲みきりです。
- (3) 本剤は本質的に沈殿を含んでいます。

【成分・分量】 90mL (45mL×2本) 中

葛根湯濃縮液・・・・81mL

(下記生薬の水製抽出液)

〔	日局カクコン 8g	日局マ	オ	ウ	4g	〕
〔	日局タイソウ 4g	日局ケ	イ	ヒ	3g	〕
〔	日局シヤクヤク 3g	日局カンゾウ 2g				〕
〔	日局シヨウキョウ 1g					〕

添加物: D-ソルビトール、白糖、安息香酸 Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、エタノール

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

J

お問い合わせ先

第一三共ヘルスケア(株)お客様相談室

0120-337-336

受付時間9時~17時(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>