ひきはじめのかぜに

第2類医薬品

カコナール®ツー2



副作用被害救済制度
電話 0120−149−931

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3−14−10

製造販売元
新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意 相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4)胃腸の弱い人 (5)発汗傾向の著しい人 (6)高齢者 (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8)次の症状のある人:むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

3.1カ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5〜6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

カコナール2
45mL

第2類医薬品

水製抽出液葛根湯

[効能・効果]
体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

[用法・用量]
次の量を朝夕、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないでください。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2〜3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)本剤は1回1本飲みきりです。
(3)本剤は本質的に沈殿を含んでいます。

[成分・分量] 90mL(45mL×2本)中
葛根湯濃縮液・・・・・81mL
(下記生薬の水製抽出液)

日局カッコン 8g 日局マオウ 4g
日局タイソウ 4g 日局ケイヒ 3g
日局シャクヤク 3g 日局カンゾウ 2g
日局ショウキョウ 1g

添加物:D-ソルビトール、白糖、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、エタノール

[保管及び取扱い上の注意]
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

J

お問い合わせ先
第一三共ヘルスケア(株)お客様相談室
0120−337−336
受付時間9時〜17時(土、日、祝日を除く)
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/