

第2類医薬品

カコナール®



お問い合わせ先

第一三共ヘルスケア(株)お客様相談室
0120-337-336
 受付時間9時~17時(土、日、祝日を除く)

<https://www.daichisankyo-hc.co.jp/>
 販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
 東京都中央区日本橋3-14-10
 製造販売元

新生薬品工業株式会社
 奈良県高市郡高取町清水台1269

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読みください。
 また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4)胃腸の弱い人 (5)発汗傾向の著しい人 (6)高齢者 (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8)次の症状のある人: むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

3. 1カ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

カコナール

30mL×3本

第2類医薬品

水製抽出液葛根湯

【効能・効果】

体中中等度以上のものの次の諸症
 感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

次の量を食間に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないでください。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は1回1本飲みきりです。(3)本剤は本質的に沈殿を含んでいません。よく振ってから服用してください。

【成分・分量】 90mL (30mL×3本) 中

葛根湯抽出液(下記生薬の水製抽出液)・・・90mL

日局カクコン…8g	日局マ オ ウ…4g
日局タイソウ…4g	日局ケ イ ヒ…3g
日局ジャクヤク…3g	日局カンソウ…2g
日局ショウキョウ…1g	

添加物: D-ソルビトール、白糖、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、エタノール

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。