

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

のどの痛み・せき・鼻水に効く ペラック®コールドTD錠

第2類医薬品

総合感冒薬

ペラックコールドTD錠の特徴

- トラネキサム酸、ジヒドロコデインリン酸塩、ジフェニルピラリン塩酸塩などを配合した総合感冒薬です。
- 抗プラスミン成分「トラネキサム酸」が、のどの痛みをおさえます。
- 鎮咳成分「ジヒドロコデインリン酸塩」が、せきをしずめます。
- 抗ヒスタミン成分「ジフェニルピラリン塩酸塩」が、アレルギー症状による鼻水をおさえます。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - （2）本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、トラネキサム酸を含有する内服薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
（眠気等があらわれることがあります）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
5. 服用前後は飲酒しないで下さい。
6. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人
 - （3）水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）
 - （4）高齢者
 - （5）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - （6）血栓のある人（脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎等）及び血栓症を起こすおそれのある人
 - （7）次の症状のある人
高熱、排尿困難
- *（8）次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- （9）肝障害を有する疑いのある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

（裏面に続く）

皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、 皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に 小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、 食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、 関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れが する・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、 これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦 しい等があらわれる。
* 呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は
増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談して下さい。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、
関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	3錠	3回 食後なるべく30分以内
15 歳 未 満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
(2) 錠剤の取り出し方 右図のように錠剤の入っているPTPシートの
凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用
して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に
突き刺さる等思わぬ事故につながります）

〈錠剤の取り出し図〉



成分・分量

9錠中

成 分	分 量	はたらき
トラネキサム酸	750mg	炎症のもととなるプラスミンをおさえて、のどの痛みを緩和します。
アセトアミノフェン	450mg	熱を下げ、頭痛等を緩和します。
エテンザミド	750mg	
ジフェニルピラリン塩酸塩	4mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみ等を緩和します。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢に作用し、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげて、せきをしずめ、たんの排出を助けます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	150mg	たんをうすめて出しやすくします。
無水カフェイン	75mg	頭痛を緩和します。

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、リン酸水素Ca、ポビドン、
クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、
リン酸リボフラビンNa

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
(4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、一度開封した後は、品質
保持の点から開封後より6カ月以内に服用して下さい。
(5) 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電 話 0120-337-336
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

B7®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1-5-27