

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

**第2類
医薬品**

24粒

▲ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人：高熱
 - 次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成分・分量 12粒中

dL-メチルエフェドリン塩酸塩・・・・・・・・・・ 37.5mg
ブアヤコールスルホン酸カリウム・・・・・・・・ 135.0mg
セルピリジニウム塩化物水和物・・・・・・・・・・ 6.0mg

添加物：リポフラビン、グリセリン脂肪酸エステル、インソール、l-メントール、香料、エタノール、プロピレングリコール、ベンジルアルコール

用法・用量

成人(15歳以上)	1回2粒	1日5～6回 口中に含み、かまわずにゆっくり溶かして服用して下さい。
及び 8歳以上		
5歳以上8歳未満	1回1粒	2時間以上の間隔をおいて服用して下さい。
5歳未満		服用しないで下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)5歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- スティックパック開封後は速やかに服用して下さい。
- 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

効能・効果

せき、たん、ぜんそく、
のどの炎症による声がれ
のどのあれ・のどの不快感・
のどの痛み・
のどのほれ

使用期間
登録期間

**のどの痛み・せき
のどの炎症による声がれ
たんに効く**

第2類医薬品

**ペラックスイート®
パインS**



Nodora-Kun



24粒 甘さスツクリシユガース
カロリーと虫歯が気になる方



Daichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931



4

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10
http://www.daichisankyo-hc.co.jp/

製造販売元
高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香町野口10

●お問い合わせ先
第一三共ヘルスケア株式会社
電話 0120-337-336
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

お客様相談室



④登録商標