

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

無臭性

いんきんたむし・水虫に

アスター[®]G軟膏

第2類医薬品

水虫・たむし薬

いんきんたむし、水虫やぜにたむしは、カビの一種である白癬菌が表皮の角質層内に寄生、繁殖しておくる皮膚病で、カユミや痛みなどの不快な症状を伴います。「アスターG軟膏」は、トルナフタートを主薬にした無臭性で刺激の少ない軟膏です。白癬菌の発育を抑えると同時に数種類の鎮痒成分がすみやかにカユミを鎮め、いんきんたむし、水虫やぜにたむしなどにすぐれた効果を発揮します。

⚠ ご使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)乳幼児。
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)患部が顔面又は広範囲の人。
 - (5)患部が化膿している人。
 - (6)「湿疹」か「いんきんたむし、みずむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
- (陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能

いんきんたむし、みずむし、ぜにたむし



陰のう部

陰のう部の疾患には本剤は使用できませんので医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

「いんきんたむし」とは…足のつけ根・太ももの内側に白せん菌が感染した場合を言います。(陰のう部の疾患は、いんきんたむしとは言いません。)

用法・用量

1日数回患部に塗布してください。

- 患部に水疱ができていたときは、無理につぶさず、水疱の上から塗布しても充分効果が得られます。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

成分・分量(100g中)

成分	含量	作用
トルナフタート	2.0 g	いんきんたむし、水虫の原因菌に対し強い抗菌作用を発揮します。雑菌による化膿を防ぎます。
酸化亜鉛	5.0 g	分泌物を吸着し、患部を乾燥させ治療を促進します。患部の炎症を緩和します。
1-メントール	2.0 g	不快なカユミや痛みを鎮めます。
ジフェニヒドラミン塩酸塩	1.0 g	
リドカイン	0.5 g	
イソプロピルメチルフェノール	0.3 g	雑菌による化膿を防ぎます。
グリチルレチン酸	0.25 g	患部の炎症を緩和します。

添加物として流動パラフィン、ワセリン、パラフィン、ステアリルアルコール、グリセリン、ステアリン酸ソルビタン、スクワラン、ステアリン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、コレステロール、ブチルパラベンを含有。

治療のポイント

(1)清潔にして

患部やその周囲は水や低刺激性の石鹸などでよく洗って、常に清潔に保ちましょう。(入浴後は、皮膚がややわかっていて治療効果を高めます。)

(2)乾燥に心がけて

乾癬菌は、湿気の多い所を好みます。通気性をよくし、患部がむれないよう心掛けましょう。

(3)根気よく

いんきんたむしや水虫は、再発しやすい皮膚病です。自覚症状がなくなっても、しばらくの間、使用を続けましょう。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

包 装

16g(チューブ入り)

姉妹品にチアントール配合のアスター軟膏

16g・25g(チューブ入り)があります。



丹平製薬株式会社

大阪府茨木市宿久庄2丁目7番6号
お客様相談室フリーダイヤル(0120)500-461
(9:00~17:00まで、土・日・祝日を除く)
<http://www.tampeico.jp>