

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるように大切に保管すること。

点眼薬

目の疲れ・かすみに

うるおい感持続

# マイティア® 美瞳

第3類医薬品

販売名 マイティア美瞳

## 特 徴

- ピント調節や新陳代謝など目の大切な機能の低下を改善し、目の疲れ・かすみ(目やにの多いときなど)に効果を発揮します。
- 涙よりも粘性の高い処方。うるおい感が持続します。
- 抗ヒスタミン成分を配合し、目の充血・かゆみを改善します。
- さわやかな清涼感があるさし心地。
- 無色澄明の目薬です。

## 有効成分6種配合

ピント調節機能改善成分  
ネオスチグミンメチル硫酸塩

新陳代謝を促進する栄養成分  
(ビタミン・アミノ酸類4種)  
●パントテール(プロビタミンB5)  
●酢酸 d- $\alpha$ -トコフェロール  
(天然型ビタミンE)  
●L-アスパラギン酸カリウム  
●タウリン

抗ヒスタミン成分  
クロルフェニラミンマレイン酸塩

## ⚠使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み  
(4) 次の診断を受けた人。  
緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状           |
|------|---------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ、刺激感 |

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
(1) 目のかすみが改善されない場合  
(2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

### その他の注意

薬液に粘性をもたせているため、点眼後しばらく視野がぼやけることがあるので注意すること。

## 効 能

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、結膜充血、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## 用法・用量

1回1～2滴を1日5～6回点眼してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2)容器の先を目、まぶた、まつ毛に触れさせないこと(目やにやその他異物等が混入することで、薬液が汚染あるいは混濁することがある)。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
- (4)点眼用にのみ使用すること。
- (5)用法・用量を厳守すること。



容器の先が目、まぶた、まつ毛に  
ふれないように

## 成分 1mL中


| 成分                     | 含量     |
|------------------------|--------|
| ネオスチグミンメチル硫酸塩          | 0.05mg |
| パンテノール                 | 1mg    |
| 酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール | 0.5mg  |

| 成分              | 含量    |
|-----------------|-------|
| L-アスパラギン酸カリウム   | 10mg  |
| タウリン            | 10mg  |
| クロルフェニラミンマレイン塩塩 | 0.3mg |

添加物：エデト酸ナトリウム水和物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、*l*-メントール、塩化ナトリウム、L-グルタミン酸ナトリウム水和物、ヒプロメロース、pH調節剤

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。特に自動車内や暖房器具の近くなど、高温となるおそれのある場所に放置しないこと。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり、品質が変わる)。
- (4)容器に他のものを入れて使用しないこと。
- (5)他の人と共用しないこと。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。  
また、使用期限内であっても、内袋開封後はすみやかに使用すること。
- (7)保存の状態によっては、容器の先周囲やキャップの内側に薬液中の成分の結晶が付くことがある。このような場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用すること。



## 包装 15mL

本製品内容についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
千寿製薬株式会社「お客様インフォメーション」  
〒541-0046 大阪市中央区平野町二丁目5番8号  
電話 ☎ 0120-07-8552 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

●タケダ健康サイト <http://takeda-kenko.jp>

製造販売元 **千寿製薬株式会社**

〒541-0046 大阪市中央区平野町二丁目5番8号

販売元 **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号