

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



# ザッツ

## 胃腸薬

第2類医薬品

### 特徴

- 胃が張った感じがする、胃もたれるといった症状に適した胃腸薬です。
- 胃腸機能を調整するカルニチン塩化物をはじめ、5種の健胃生薬が、弱った胃のはたらきを高め、胃部膨満感、胃もたれ等にすぐれた効果をしめします。
- 3種の制酸成分の組み合わせにより、おだやかな制酸作用をしめし、胃重、胃部不快感、胸やけ等を緩和します。
- 生薬のカンゾウが飲みすぎ、食べすぎ等により荒れた胃の粘膜の修復を助けます。
- スッとした清涼感のある服用しやすい灰かつ色微粒状の細粒です。
- 携帯に便利な分包(アルミ包装)です。

- 胃部膨満感
- 胃もたれ
- 胃部不快感

### ⚠ 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと  
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の診断を受けた人。  
腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
□の渴き、便秘、下痢

4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 効能

- 胃部・腹部膨満感、胃もたれ、胃重、胃部不快感、食欲不振、胃弱
- 飲みすぎ、食べすぎ、消化不良、胸つかえ
- 胸やけ、げっぷ、胃痛、胃酸过多、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐

## 用法・用量

次の量を、食前または食後に、水またはお湯で服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	
11歳～14歳	2/3包	
8歳～10歳	1/2包	
5歳～7歳	1/3包	
5歳未満	服用しないこと	3回



<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

## 成 分


3包(4.2g、15歳以上の1日服用量)中

はたらき	成 分	含 量
胃腸機能の調整 健胃生薬	カルニチン塩化物	450mg
	陳皮乾燥エキス	150mg(チンピ1,200mgより抽出)
	コウボク乾燥エキス	20mg(コウボク240mgより抽出)
	ソウジュツ末	200mg
	ショウキョウ末	100mg
	チョウジ末	30mg
胃粘膜の修復 制 酸	カンゾウ末	150mg
	合成ヒドロタルサイト	700mg
	水酸化マグネシウム	450mg
	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	300mg

添加物：合成ケイ酸Al、D-ソルビトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、L-メントール

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申しあげます。

武田コンシューマヘルスケア株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087  
受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

なお、タケダ健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく紹介しています。

タケダ健康サイト

検索

<http://takeda-kenko.jp>

製造販売元 武田コンシューマヘルスケア株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号