

本品には添付文書はついておりませんので、直接の内袋の表示を掲載しています。



貼るアクテージ[®]L

第2類医薬品

特 徴

- 鎮痛消炎成分インドメタシンを配合した含水ジェルタイプの外用鎮痛消炎プラスターです。
- インドメタシンがプロスタグランジンの産生を抑え、鎮痛・消炎作用を示します。
- 貼付部分に含水ジェルを使用しているため、はがれにくく、お肌にやさしくフィットします。
- 微香性で臭いが気になりません。●内袋には、チャックがついているため保管に便利です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等または化膿している患部。
3. 長期連用しないこと

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この内袋を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効 能

関節痛、腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腱鞘炎(手・首首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付すること。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用すること。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用すること。
- (4) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。
- (5) 連続して2週間以上使用しないこと。

成 分 膏体 100g中

インドメタシン・・・・・・・・・・・・・ 1.0g

添加物：l-メントール、パラベン、エデト酸ナトリウム水和物、プロピレングリコール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ヒドロキシプロピルセルロース、pH調整剤、その他3成分

保管および取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は内袋に入れ、開口部のチャックをきちんとしめて保管すること。
- (5) 使用期限(外箱および内袋に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべくすみやかに使用すること。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎ 0120-567087
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 武田薬品工業株式会社
大阪市中央区道修町四丁目1番1号