*下線部:2017年5月改訂

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ビタミンD3・マグネシウム配合 カルシウム剤

新カルシチュウ。D3

新カルシチュウD3の特徴

- 1.1日1回、2錠(15歳以上)で、カルシウム 610mgが摂れます。
- 2. カルシウムの吸収を促進するビタミンD3、さらにマグネシウムを配合しています。
- 3. 服用しやすい、かみくだけるソフトチュアブル錠。水なしでそのまま服用できます。
- 4. さわやかなヨーグルト風味です。

使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 医師の治療を受けている人
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登 録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状	
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	
消 化 器*	吐き気・嘔吐、腹部不快感*	

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 便秘、下痢
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

次の場合のカルシウムの補給:妊娠・授乳期、老年期、発育期

用法・用量

次の量を服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1回 ・必ずかみくだくか口中で溶
7歳以上15歳未満	1錠	かして服用して下さい。
7 歳 未 満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

チュアブル錠とは、かみくだくか口中で溶かして服用する錠剤です。 カルシウム剤の場合、有効成分含有量が多いため、普通の錠剤の場合、 1回に多くの錠剤を服用しなければならないものが、チュアブル錠にすることにより1回の服用錠数を減らすことが可能になりました。 錠剤を飲み込むのが苦手な人にも適した剤型です。

成 分・分 量

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓し、箱に入れて保管して下さい。キャップの閉め方が不十分な場合、湿気等の影響で薬が変質することがありますので、使用のつどキャップをきちんと閉めて下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。 (誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤をボトルに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- (5) ボトルの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- (6) ボトルの中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違って服用しないよう注意して下さい。
- (7) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
- (8) 箱とボトルの「開封年月日」記入欄に、ボトルを開封した日付を記入して下さい。
- (9) 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に なるべくすみやかに服用して下さい。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申しあげます。

武田コンシューマーヘルスケア株式会社「お客様相談室」 フリーダイヤル 0120-567-087

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

なお、タケダ健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく 紹介しています。

タケダ健康サイト

検索ト

http://takeda-kenko.jp

製造販売元

日東薬品工業株式会社 京都府向日市上植野町南開35-3 販元兀 -