

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ビタミンD₃・マグネシウム配合 カルシウム剤

新カルシチュウ[®]D₃グリーンT

新カルシチュウD₃グリーンTの特徴

- 1日1回、2錠(15歳以上)で、カルシウム 610mgが摂れます。
- カルシウムの吸収を促進するビタミンD₃、さらにマグネシウムを配合しています。
- 服用しやすい、かみくだけのソフトチュアブル錠。水なしでそのまま服用できます。
- まろやかな抹茶風味です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
医師の治療を受けている人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、腹部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘、下痢
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効 能・効 果

次の場合のカルシウムの補給：妊娠・授乳期、老年期、発育期

用 法・用 量

次の量を服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1回 かみくだくか口中で溶かして服用して下さい。
7歳以上15歳未満	1錠	
7 歳 未 満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

チュアブル錠とは、かみくだくか口中で溶かして服用する錠剤です。カルシウム剤の場合、有効成分含有量が多いため、普通の錠剤の場合、1回に多くの錠剤を服用しなければならないものが、チュアブル錠にすることにより1回の服用錠数を減らすことが可能になりました。錠剤を飲み込むのが苦手な人にも適した剤型です。

成分・分量

本剤は、チュアブル錠で、2錠中に次の成分を含有しています。

沈降炭酸カルシウム	1525mg
(カルシウムとして)	610mg
炭酸マグネシウム	118.4mg
(マグネシウムとして)	30mg
コレカルシフェロール(ビタミンD ₃)	400IU
添加物：中鎖脂肪酸トリグリセリド、ラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、D-ソルビトール、緑茶末、ポビドン、ステアリン酸Mg、銅クロロフィリンNa、香料、バニリン、プロピレングリコール、グリセリン、エタノール	

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。キャップの閉め方が不十分な場合、湿気等の影響で薬が変質することがありますので、使用のつどキャップをきちんと閉めて下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤をボトルに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- ボトルの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- ボトルの中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違っても服用しないよう注意して下さい。
- 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
- 箱とボトルの「開封年月日」記入欄に、ボトルを開封した日付を記入して下さい。
- 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用して下さい。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

アリナミン製薬株式会社「お客様相談室」
フリーダイヤル 0120-567-087
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

なお、健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく紹介しています。

健康サイト

検索

<https://alinamin-kenko.jp>

