

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

# ストレージ® タイプI

漢方製剤 〈安中散〉

第2類医薬品

## 特徴

- ストレスなどによる胃痛に、漢方処方「安中散」が優れた効果をあらわします。
- 普段から胃の調子が悪いといった慢性胃炎にも効果をあらわします。
- 体力中等度以下で、腹部は力がなく、胃痛または腹痛のある方に適したお薬です。
- のみやすい淡かっ色の顆粒(スティック包装)です。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 効能

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛または腹痛があつて、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：  
神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

## 用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	2回
7歳～14歳	2/3包	
4歳～6歳	1/2包	
2歳～3歳	1/3包	
2歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

## 成 分

2包(3.75g、15歳以上の1日服用量)中に次の成分を含有する。

安中散料エキス	.....	0.75g (乾燥エキスとして)
「ケイヒ	.....	2.0g カンゾウ ..... 0.5g
エンゴサク	.....	1.5g シュクシャ ..... 0.5g
ボレイ	.....	1.5g リョウキョウ ..... 0.25g
ウイキョウ	.....	0.75g 上記生薬より抽出

添加物：乳糖水和物、ステアリン酸Mg

<成分に関連する注意>

生薬を用いた製品なので、製品により顆粒の色調が多少異なることがあります  
が、効果には変わりありません。

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に箱に入れて保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い  
申しあげます。

アリナミン製薬株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

なお、健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく紹介  
しています。

健康サイト

検索

<https://alinamin-kenko.jp>



販売元 アリナミン製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

製造販売元 株式会社ツムラ

〒107-8521 東京都港区赤坂二丁目17番11号