

殺菌消毒薬

Ononine Solution

オロナイン[®]液

第2類医薬品

【効能・効果】すり傷、きり傷、かき傷、さし傷、
外用専用 靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
80mL 使用期限、製造番号：容器底部に表示

販売 大塚製薬株式会社
東京都千代田区神田司町2-9
お客様相談窓口 ☎03-3293-3212
製造販売元 株式会社大塚製薬工場
徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115

【用法・用量】

1日数回患部に噴霧
又はガーゼ、脱脂綿に浸して
塗布します。

①小児に使用させる場合には、保護者の
指導監督のもとに使用させてください。

②目に入らないように注意してください。万一、
目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗っ
てください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療
を受けてください。③本剤は外用にのみ使用してください。
④患部やその周囲の汚れを落としてから使用してください。

【使用上の注意】[相談すること]1.次の人は使用前に医師、薬剤
師又は登録販売者に相談してください。①医師の治療を受けている
人②薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人③患部が広範
囲の人④湿潤やただれのひどい人⑤深い傷やひどいやけどの人2.使用
後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用
を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してく
ださい。皮膚に発疹・発赤、かゆみ、はれ、乾燥、ひび
われがあらわれた場合3.5～6日間使用しても症状が
よくならない場合は使用を中止し、この製品を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分】100mL中：クロルヘキシジングルコン酸塩液
(20%)0.25mL、ジブカイン塩酸塩100mg、クロルフェニ
ラミンマレイン酸塩200mg、ナファゾリン塩酸塩100mg
添加物としてエタノール、精製水を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】①直射日光の当たら
ない涼しい所に密栓して保管してください。②小児
の手の届かない所に保管してください。③他の容
器に入れ替えないでください。(誤用の原因になっ
たり品質が変わります。)④使用期限をすぎた製品
は使用しないでください。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



ボトル
キャップ
パイプ
外装フィルム



325-1P6