

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



手湿疹に

メディクイック

クリーム

かゆくてつらい手湿疹、洗剤かぶれ、割れて痛い皮膚炎に

湿疹・かぶれの治療薬

販売名:メンソレータム®

メディクイック®クリームR

第2類医薬品

**単なる手荒れと思って保湿ケアをしても、
なかなか治らない…こんな症状ありませんか。**


洗剤・シャンプーで
かぶれる

水がしみるほど
割れて痛い

小さな水ぶくれや
湿疹ができる

眠れないほど
かゆさが気になる

水仕事や手指を使う作業によって皮膚の油分・水分が奪われ、乾燥症状が悪化すると、外的刺激に負けやすくなり、炎症や湿疹、つらいかゆみなどの症状を引き起こすことがあります。そんな手湿疹や洗剤かぶれを早く治すには、がまんせずに「効く治療薬」で症状をおさえることをおすすめします。



**「メンソレータム®メディクイック®クリームR」は、かゆみや
小さなぶつぶつ（水ぶくれ）など、手湿疹のつらい症状に効く治療薬です。**

■高い消炎効果のプレドニゾロン 吉草酸エステル酢酸エステル配合 （アンデドラッグステロイド）

患部で優れた効き目を発揮し、
体内に吸収されると低活性に…。

■肌を修復するアラントイン配合

傷ついた肌を修復するアラントイン
他4種の有効成分が効果を発揮。

■患部にしみにくい低刺激性タイプ

イメージ図

かゆみに
クロタミトン®
リドカイン

炎症に

プレドニゾロン
吉草酸エステル
酢酸エステル

肌を修復

アラントイン

患部を殺菌

イソプロピルメチル
フェニール

手のひらなどの広い患部にもよくのびてベタつかないクリーム。手をよく使う日中にも。

**治療の
コツ**

こまめにぬる

特に薬が落ちやすい部位
（手・腕など）には
一日数回ぬり直すと効果的です。

就寝時にじっくり

患部を休めることができ、
薬もとれにくいから、
おやすみ前のご使用は有効です。

- ・症状が改善するのにともない、メディクイックの使用回数を適宜減らしていきましょう。
- ・また、手湿疹症状の再発を防ぐためには、しっかり保湿ケアを心がけることが大切です。
- ・症状が治りにくい時、また、慢性的に症状をぶりかえす方は、医師に相談されることをおすすめします。

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部
 - (2) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮フ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

■効能・効果 湿疹、かぶれ、かゆみ、皮フ炎、じんましん、あせも、虫さされ

■用法・用量 1日数回、適量を患部にぬってください。

●用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみご使用ください。
- (5) ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。

■成分・分量(1g中)

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル・・・1.5mg
 (アンデドラッグステロイド)
 クロタミトン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50mg
 リドカイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10mg
 アラントイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2mg
 イソプロピルメチルフェノール・・・・・・・・ 1mg

添加物として、パルミチン酸イソプロピル、ワセリン、ペヘニルアルコール、ステアリルアルコール、セタノール、ステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール、乳酸、ジメチルポリシロキサン、パラベン、BHTを含有する。

■保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1