販売名　ロート当帰飲子錠

【効能・効果】冷え症のものの次の諸症：
慢性湿疹（分泌物の少ないもの）、かゆみ

⚠ 使用上の注意

相談すること

1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
（1）医師の治療を受けている人
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人
（3）胃腸が弱く下痢しやすい人
（4）今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2.次の場合は直ちに服用を中止し、中の袋を持って医師又は薬剤師に相談すること。
（1）服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

（2）1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。　下痢

【用法・用量】次の量を1日3回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。
成人（15才以上）…1回4錠、7才以上15才未満…1回3錠、5才以上7才未満…1回2錠、5才未満…服用しないこと ※食間とは、食後2～3時間を指す。

〈用法・用量に関連する注意〉（1）用法・用量を厳守すること。（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】12錠中 当帰飲子エキス3.2g（トウキ2.5g、シャクヤク1.5g、センキュウ1.5g、シツリシ1.5g、ボウフウ1.5g、ジオウ2.0g、ケイガイ0.75g、オウギ0.75g、カシュウ1.0g、カンゾウ0.5gより抽出）を含む。
添加物として、CMC-Na、無水ケイ酸、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ、三二酸化鉄を含む。

【保管及び取り扱い上の注意】（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。（2）小児の手の届かない所に保管すること。（3）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる）（4）湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。（5）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

製造販売元：
ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1
TEL.06-6758-1230