

【効能・効果】 虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症：
貧血、不眠症、精神不安、神経症



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 次の場合は直ちに服用を中止し、中の袋を持って医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

【用法・用量】 次の量を1日3回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。
成人(15才以上)…1回4錠、7才以上15才未満…1回3錠、5才以上7才未満…1回2錠、
5才未満…服用しないこと ※食間とは、食後2～3時間を指す。

<用法・用量に関連する注意> (1) 用法・用量を厳守すること。(2) 小児に服用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 12錠中 加味帰脾湯エキス粉末2.8g(ニンジン1.5g、ビャクジュツ1.5g、ブクリョウ1.5g、
タイソウ0.75g、サイコ1.5g、オウギ1.0g、トウキ1.0g、サンシシ1.0g、オンジ0.75g、カンゾウ0.5g、
モッコウ0.5g、ショウキョウ0.25g、サンソウニン1.5g、リュウガンニク1.5gより抽出)を含む。
添加物として、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、二酸化ケイ素、セルロースを含む。
※本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

【保管及び取り扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管
すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 湿気により、変色など品質に影響を与える
場合があるのでぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

発 売 元： **ROHTO** ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

TEL.06-6758-1230

製造販売元： **大峰堂薬品工業株式会社**

奈良県大和高田市根成柿574番地