

【効能・効果】 精神不安があって、どうき、不眠などを伴う次の諸症：
 高血圧の随伴症状（どうき、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、
 小児夜なき



使用上の注意

❌ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - 次の医薬品を服用している人：瀉下薬（下剤）
- 次の場合は直ちに服用を中止し、中の袋を持って医師又は薬剤師に相談すること。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

●まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる

- 2ヵ月位（小児夜なきに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。 軟便、下痢

【用法・用量】 次の量を1日3回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。

成人（15才以上）…1回4錠、7才以上15才未満…1回3錠、5才以上7才未満…1回2錠、5才未満…服用しないこと ※食間とは、食後2～3時間を指す。

＜用法・用量に関連する注意＞（1）用法・用量を厳守すること。（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 12錠中 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス粉末1.95g（サイコ2.5g、ハンゲ2.0g、ブクリョウ1.5g、ケイヒ1.5g、オウゴン1.25g、タイソウ1.25g、ニンジン1.25g、ボレイ1.25g、ショウキョウ0.4g、ダイオウ0.5g、リュウコツ1.25gより抽出）を含む。添加物として、ステアリン酸Mg、CMC-Na、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化Al/Mg、乳糖を含む。

※本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

【保管及び取り扱い上の注意】（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。（2）小児の手の届かない所に保管すること。（3）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる）（4）湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。（5）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

発売元：ROHTO ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

TEL.06-6758-1230

製造販売元：大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574番地