

使用前にこの説明書をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



口唇のひび割れ・口角炎治療薬 メンソレータム® ヒビプロ® LP

第3類医薬品


冬になるとおこる唇のひび割れに!

つらい唇や口角のひび割れは、乾燥により唇の水分が失われることなどで起こります。メンソレータム® ヒビプロ® LPは、一度割れるとなかなか治りにくいひび割れを効果的に修復しながら、患部をしっかりと保護。こだわりの密着処方で、ひび割れてしまった唇をなめらかな唇へと導きます。

ひびに効果的な2つのポイント!

修復


アラントイン
パンテノール
ビタミンE誘導体



有効成分が、治りにくいいひび割れを修復

保護

ワセリン基剤



密着処方で、ひび割れをしっかり保護



就寝前、ひび割れた患部に塗ると、お休み中も効果的に修復します。★



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 潤滑やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 フ	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
- (3)口唇への外用にのみ使用すること。
- (4)容器の先を、直接唇につけないこと。(ケガをする恐れがあります)

成分・分量(100g中)

●グリチルレチン酸	0.3g
●ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	0.1g
●トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)	0.2g
●アラントイン	0.5g
●パンテノール	0.5g

添加物として、ワセリン、流動パラフィン、サラシミツロウ、グリセリン、ポリエチレン、マイクロクリスタリンワックス、ショ糖脂肪酸エステル、パラベン、ビタミンB₂を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かないところに保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

※ 冬期など気温が低い時に製剤が硬くなってしまい出しにくい時は、手で温めてからご使用ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)