



荒れた手肌の治療薬

皮フ軟化薬

メンソレータム®
MENTHOLATUM® RETINOACE

第3類医薬品

レチノエース

尿素20%+レチノール誘導体配合

水仕事や乾燥で手がガサガサ…。 メンソレータム®レチノエースで、 荒れた手肌もしっとりなめらかに。

こまめにケアをしているつもりでも、いつの間にかひどくなってしまう手肌の荒れ…。こんな経験ありませんか？頑固なガサガサや手荒れは水仕事や乾燥などによって皮フのバリア機能が壊され、肌自体の「水分を保持する力」が弱くなってしまうことなどが原因と考えられます。そんな肌には水分を与えるだけでなく、「肌に水分をとどめて逃がさない」ことが必要です。「メンソレータム®レチノエース」は、尿素20%やレチノール誘導体などの有効成分が効果的に荒れた肌に作用。肌の代謝を高めて荒れた状態をなめらかに整えながら、乾燥した肌に水分をとどめて逃さないようにします。ガサガサ・ゴワゴワに荒れてしまった手肌も、もとのしっとりなめらかな状態にしてくれます。

有効成分がじっくり浸透して、 荒れた手肌に効く！

尿素20% (保湿成分)

乾燥した皮フに水分を集めて逃がさないようにしてくれます。

レチノール誘導体 (皮膚代謝改善成分)

皮フの代謝を高めて、荒れた肌をなめらかにしてくれます。

ビタミンE誘導体

【トコフェロール酢酸エステル】(血流改善成分)

血行を促進し、荒れた患部の治りを助けます。

グリチルリチン酸－アンモニウム (抗炎症成分)

皮フの炎症を鎮めてくれます。

もとのしっとり
なめらかな手肌に！



おすすめの使い方

夜10時から午前2時くらいは、肌の新陳代謝が最も活発な時間と言われています。



夜寝る前にもしっかりと
塗り込んでください。



お風呂上りのご使用も
おすすめです。



かためのクリームなので、
寝ている間に手指を
しっかりコートします。

使用上の注意 ⚠

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目のまわり、粘膜等
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ) 部位
- (3) かさぶたの様に皮フがはがれているところ
- (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)

相談すること 🗣️

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮フがはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくなりない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

成分(1g中)

尿素 200mg
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体) 20mg
グリチルリチン酸一アンモニウム 5mg
ビタミンA油 5mg
(ビタミンAとして5000国際単位)

添加物として、ワセリン、流動パラフィン、ステアリルアルコール、セタノール、ポリソルベート60、ジメチルポリシロキサン、グリシン、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポビドン、トリエタノールアミン、エデト酸Na、BHT、香料、黄色4号(タートラジン)を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 本剤のついた手で目や粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけます。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401067702