



メンソレータム®
AD

あせもの治療薬

つらいかゆみをすばやく抑え、
さらっと爽快に治します。

**あせもは子供にのみ
できるもの**

と思っていないませんか?

“あせも”は、大量に汗をかいたときに体内の汗がうまく排出されず、汗の通り道である汗管がつまってしまい、**汗が皮膚の中にたまってしまう**ことが原因で起こります。汗をかくことでできる“あせも”は、実は、**大人にもできる**のです。

そんなあせもに、「メンソレータム®ADソフト」。

かきむしってひどくなる前にしっかり治療。

すーっと治して、長引かせない!

あせも・かぶれに効く**6つの有効成分**

グリチルリチン酸二カリウム

赤み・炎症を抑えます。

ジフェンヒドラミン

かゆみの元であるヒスタミン
の作用を止めます。

イソプロピルメチルフェノール

荒れた患部を消毒・殺菌し、
雑菌の繁殖をおさえます。

クロタミトン

かゆみをすばやく、
しっかり止めます。

かゆみ・赤み

すーっと治す

早めにケアして、
長引かせない

l-メントール

爽やかな清涼成分で
かゆみを鎮めます。

トコフェロール酢酸エステル

血行を促進し、
患部の修復を促進します。

こんな症状にも…

汗ばむ季節の…



下着・衣服の締めつけなどによる
くっつきかぶれ・かゆみ



アクセサリーによる
かぶれ・赤み

べたつかない
クリーム

- 肌になじみやすく、伸ばしやすい。
- さらっとした使用感
- 白残りせず衣服を汚しにくい。

小さなお子さまにも

- 無香料・無着色
- ステロイド剤は配合していません。



使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

鎮痒消炎薬 [販売名] メンソレータム®ADソフト

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等 (2) 傷のあるところ



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果 あせも、かゆみ、かぶれ、湿疹、皮膚炎、ただれ、じんましん、虫さされ、しもやけ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(3) 外用にのみご使用ください。

成分・作用(1g中)

有効成分	配合量	作用
ジフェンヒドラミン	10mg	かゆみの元であるヒスタミンの作用を止めます。
クロタミトン	20mg	かゆみをすばやく、しっかり止めます。
グリチルリチン酸二カリウム	10mg	赤み・炎症をおさえます。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	荒れた患部を消毒・殺菌し、雑菌の繁殖をおさえます。
l-メントール	10mg	爽やかな清涼成分でかゆみを鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行を促進し、患部の修復を促進します。

添加物として、スクワラン、グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、流動パラフィン、ポリソルベート60、セタノール、カルボキシビニルポリマー、ジメチルポリシロキサン、トリエタノールアミン、ステアリン酸ソルビタン、パラベン、キサンタンガム、エデト酸Naを含有する。
ステロイド成分を配合していません。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401274801