

本情報は箱に表示されております。

ご使用の前に、この説明文(外箱に表示)をよくお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

平成23年11月改訂

第2類医薬品

イチジク浣腸^{かんちょう}® 40E

特 徴

便秘に早く効きます。

使用しやすいロングノズル。首が動いて曲がるソフト容器です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

連用しないで下さい。
(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになります。)

🗨 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
 - (3) 高齢者。
 - (4) 次に症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
 - (5) 次に診断を受けた人。
心臓病。
- 2～3回使用しても排便がない場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

その他の注意

次の症状があらわれることがあります。
たちくらみ、肛門部の熱感、腹痛、不快感

効能・効果

便秘

用法・用量

12歳以上 1回1個(40g)を直腸内に注入して下さい。
それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入して下さい。
〔2本目を使用の際は、1時間あけた方が効果的です。〕

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんして下さい。
(使用後すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
- (3) 12歳未満の小児には、使用させないで下さい。
- (4) 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意して下さい。
- (5) 冬季は容器を温湯(40℃位)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。
- (6) 浣腸にのみ使用して下さい。(内服しないで下さい。)

【イチジク浣腸の使い方】



- ノズルを真上に向け、薬液を少し押し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。

成分・分量

本品 1 個(40g)中 日局グリセリン……………20.00g
添加物…ベンザルコニウム塩化物含有。 溶剤…精製水使用。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包 装】 40g×2コ入 40g×10コ入

お問い合わせ先

イチジク製薬株式会社 お客様相談室
電話番号：03-3829-8214(直通)
受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 **イチジク製薬株式会社**
東京都墨田区東駒形 4-16-6

(日本製)

便秘・浣腸について

詳しくは

イチジク浣腸

検索

<http://www.ichijiku.co.jp>

(独)医薬品医療機器総合機構
副作用救済制度
☎ 0120-149-931