

ハリソン[®]Fb温感

ここから押して
開けてください

この箱に記載してある説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

- フエルビナクが筋肉や関節の痛みに効果を発揮します。
- ホットマルト製法で皮膚への刺激性がほとんどありません。
- 伸縮性に優れた素材で関節部にもピッタリフィットします。
- 貼りやすい構造の3ピースライナーを採用しています。

2014.02改訂 △ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊娠又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください

☏ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・はれ・かゆみ・痛み・ヒリヒリ感・かぶれ・水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

使用期限

製造番号

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

△ 用法及び用量に関する注意

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ・痛み等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(5) 汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくくき取ってから使用してください。(6) 強い刺激を感じことがありますので、入浴時の30分以上前にはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。(7) 本剤に触れた手で、眼・鼻腔・口唇等の粘膜に触れないよう注意してください。

【成分・分量】膏体100g中にフェルビナク0.5g、ノルワニリルアミド0.025gを含有

添加物: スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、流動パラフィン、その他4成分を含有する。

【内 容】7cm×10cm・・・16枚入

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります)。(4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売業者  共立薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1085番地

お問い合わせ お客さま相談室 ☎ 0744-52-4741
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)