

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要なときに読めるように大切に保管すること。

抗菌性点眼薬

ものもらい・結膜炎に

マイティア® 抗菌目薬

第2類医薬品

販売名 マイティア抗菌目薬

特徴

- 抗菌作用を示す持続性サルファ剤の配合により細菌によって起こるものもらい、結膜炎などに効果をあらわします。
- 抗炎症作用により結膜炎などで起こる目の充血やかゆみを改善します。
- 無色～微黄色澄明の点眼液です。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 3～4日間使用しても症状がよくなる場合

効 能

ものもらい、結膜炎(はやり目)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ

ものもらい、結膜炎(はやり目)について

ブドウ球菌、肺炎球菌などの細菌の感染によって起こる目の病気には、ものもらいや結膜炎(はやり目)などがあります。

このような病気のとときには、まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。(なお、ものもらいは体質的に起こり易い場合がありますが、過労や睡眠不足などで体力が低下しているときに起こり易いので、疲労をさけ、睡眠を十分とるよう心掛けてください。)

用法・用量

1回2～3滴を1日5～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないこと。
また、混濁したものは使用しないこと。
- (3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
- (4)点眼用에만使用すること。
- (5)用法・用量を厳守すること。



容器の先がまぶた、まつ毛にふれないように

成分

1mL中

成分	含量
スルファメトキサゾール	40mg
グリチルリチン酸二カリウム	1mg


添加物：エデト酸ナトリウム水和物、pH調節剤

〈成分に関連する注意〉

本剤の点眼により、口中に苦味または甘味を感じることがありますが、これは本剤に含まれるスルファメトキサゾールおよびグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に流れ出てくるためで心配ありません。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。特に自動車内や暖房器具の近くなど、高温となるおそれのある場所に放置しないこと。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4)他の人と共用しないこと。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
また、使用期限内であっても、開封後はすみやかに使用すること。
- (6)保存の状態によっては、容器の先周囲やキャップの内側に薬液中の成分の結晶が付くことがあります。このような場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用すること。
- (7)容器に他のものを入れて使用しないこと。



包装

15mL

本製品内容についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
千寿製薬株式会社「お客様インフォメーション」
〒541-0046 大阪市中央区平野町二丁目5番8号
電話(06)6201-8552 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

●タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

製造販売元 **千寿製薬株式会社**

〒541-0046 大阪市中央区平野町二丁目5番8号

販売元 **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号