

この添付文書は、お薬とともに保管し服用の際には必ずお読みください。

止瀉薬

乳酸菌配合

第2類医薬品

# 新宇津こども下痢止め

新宇津こども下痢止めは、下痢を止める成分、腹痛をやわらげる成分に腸の働きを整えるラクトミン(乳酸菌)を配合した顆粒剤です。ヨーグルト風味で苦みを感じさせない飲みやすい味です。携帯にも便利なスティックタイプの分包剤です。

## 特 長

- 1 タンニン酸ベルベリンは、腸粘膜を保護し、腸への刺激をやわらげます。また、抗菌作用によって腐敗、発酵をおさえ下痢を止めます。
- 2 ロートエキスは、腸の運動を正常化してお腹の痛みをやわらげ、腸液の分泌をおさえて下痢を止めます。
- 3 ラクトミン(乳酸菌)は、腸内で乳酸をつくり出して有害菌の増殖や腸内発酵、腐敗をおさえます。

## ⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、止瀉薬に定められた注意事項として成人が服用される際のことも記載しております。

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。  
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(4) 高齢者。  
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 次の症状のある人。排尿困難  
(7) 次の診断を受けた人。心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、目のかすみ

4.5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**その他の注意** 母乳が出にくくなることがあります。

### [効能・効果]

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

### [用法・用量]

次の量を、食後に服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
3才以上8才未満	1包	3回
1才以上3才未満	1/2包	
1才未満	服用させないこと	

(1)定められた用法及び用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### [成分・分量]

1日量(3包)中

(1包:1.2g)

成分	分量	作用
ラクトミン	300mg	腸内で乳酸を作り出し、有害菌の増殖や腸内発酵、腐敗をおさえます。
タンニン酸ベルベリン	75mg	腸粘膜を保護し、腸への刺激をやわらげるとともに抗菌作用により腐敗、発酵をおさえ、下痢を止めます。
ロートエキス2倍散	24mg	腸の運動を正常にし、お腹の痛みをやわらげます。

添加物として、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、セルロース、デキストリン、乳糖、白糖、ナレシヨゲンブ、香料、プロピレングリコール、エタノール、エチルパロリン、グリセリン、バニリンを含有します。

### [保管及び取扱上の注意]

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)1包を分割した残りは袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

問い合わせ先 宇津救命丸株式会社 お客様相談室

☎03-3295-2681

(平日9:00～17:00)

発売元 **宇津救命丸株式会社** 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-3  
TEL.03(3291)2661(代表)

製造販売元 **日東薬品工業株式会社** 〒617-0006 京都府向日市上植野町南開35-3