

うがい薬



**炎症をおさえる
水溶性アズレン配合**

**1回分のうがい必要量が
ワンプッシュ!
カンタン計量**

計量カップ付

口の中やのどのハレに
パプルショット
うがい薬F

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
 - 口内のひどいただれ
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	刺 激 感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

口腔・咽喉のはれ、口腔内の洗浄

【成分・分量】

本品100mL中
アズレンスルホン酸ナトリウム(水溶性アズレン)…0.4g
添加物としてエタノール、g-メントール、pH調整剤、香料、
その他3成分を含有する

保管及び取扱上の注意

- 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください
(誤用の原因となったり品質が変わる場合があります)
- 誤って衣類等に付着した場合は、すぐに水でよく洗い落としてください
- 計量カップは使用のつど、水洗い等して常に清潔に保管してください
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください
(使用期限はパッケージ底面に記載しております)
- 火気に近づけないでください

50mL (約100回分)

第3類医薬品

うがい薬



**炎症をおさえる
水溶性アズレン配合**



**カンタン計量
ワンプッシュ**

約100回分

口の中やのどのハレに
パプルショット
うがい薬F

計量カップ付

第3類医薬品 50mL

用法・用量

1 回約0.5mLの本品を水又は微温湯約100mLに薄めて、数回うがいをしてください。これを一日数回行ってください。




【用法・用量に関する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください
(必ず守って使用してください)
- (2) 小児に使用させる場合には、必ず保護者監督のもとで使用させてください
- (3) 目に入らないよう注意してください
万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、眼科医の診察を受けてください
- (4) 使用後はノズル付近をティッシュペーパー等で拭き取り、清潔にしてからキャップをしっかりはめてください
- (5) うがい用におのみ使用し、内服剤やのどスプレーとして使用しないでください
- (6) 本品はご使用の度に薄め、薄めた後は早めにご使用ください
- (7) 1回の吐出量は目安ですので、カップの目盛りを確認してから薄めてください
- (8) 強い衝撃を与えると液ダレを起こす事があります

うがい液のうすめ方

1. 本剤をカップへ1押し(約0.5mL)入れてください。※この時カップ底面の目盛りが水平になる様にカップを傾けてください。(45°)
2. カップを水平に戻し、上部に刻んだある100の線まで水を入れます。(水 約100mL)



最初うがい液が出るまで数回押してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お客様相談室 TEL: 0744-21-5588
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

白金製薬株式会社
奈良県橿原市上品寺町515
http://www.sirogane.info/
ダイヤ製薬株式会社
奈良県橿原市上品寺町515