



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。




乾燥性皮膚炎治療薬
第2類医薬品

特 徴

慢性的な乾燥性炎症が出やすい皮膚の保湿に

保湿・抗炎症・血行促進作用を持つ「ヘパリン類似物質」が、
ドライスキンに優れた保湿力を発揮し、皮膚をなめらかな状態にします。

ヘパリン類似物質【3つの特徴】



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）
1. 出血性血液疾患（血友病、血小板減少症、紫斑病など）の人は使用しないでください。
（血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります。）
 2. 次の部位には使用しないでください。
目や目の周囲、粘膜（口腔、鼻腔、膣など）。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、
乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ（ただれを除く）、
きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり（顔面を除く）、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのばして貼ってください。

<用法・用量に関する注意>

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 2. 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、異常があるときは医師にご相談ください。
 3. 外用にのみ使用してください。
- ※出血のある傷口には使用しないでください。（血が止まりにくくなる場合があります。）
※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

成 分

100g中

ヘパリン類似物質・・・0.3g

添加物：トリイソオクタン酸グリセリン、オレフィンオリゴマー、ジメチルポリシロキサン、セトステアリルアルコール、
ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、パラベン、グリセリン、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、
マクロゴール、D-ソルビトール、エデト酸ナトリウム、エタノール

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
4. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

お問い合わせ先

製品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

ノバルティス ファーマ株式会社 お客様相談室
〒106-8618 東京都港区西麻布4-17-30

電話：03 (5766) 2615

受付時間 9：00～17：00 （土日祝・その他当社休業日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168番地

販売元

ノバルティス ファーマ株式会社
東京都港区西麻布4-17-30