

目、耳、ハナ、のどに使用しないこと

使用前に次の説明を必ずお読みください。

水虫・たむし用薬 1日1回で効く ラミシールプラス ジェット

第②類医薬品

殺真菌成分 テルビナフィン塩酸塩配合

水虫・たむしは白癬菌（水虫菌）というカビ（真菌）が皮膚表面にある角質層に感染・寄生しておきる皮膚病です。ラミシールプラス液は、スイス・ノバルティス社が開発した殺真菌成分テルビナフィン塩酸塩を配合する水虫・たむし治療薬です。

特徴

- 有効成分である「テルビナフィン塩酸塩」の優れた殺真菌作用と角質層への浸透力は、1日1回の塗布で薬剤が患部に留まり、かゆみや痛みなどを引き起こす水虫・たむしに持続的に効果を発揮し、症状を治していきます。
- クロタミトンが患部の不快なかゆみを鎮めます。
- グリチルレチン酸が患部の炎症を抑えます。
- トメントールが爽やかな使用感を与えます。
- ジェットタイプのスプレー剤だから広い範囲の乾燥（カサカサ）水虫におすすめです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等）を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないこと

- （1）目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等
- （2）湿疹
- （3）湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人
- （2）妊婦又は妊娠している可能性のある人
- （3）乳幼児
- （4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- （5）患部が顔面又は広範囲の人
- （6）患部が化膿している人
- （7）「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人
（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	かぶれ、刺激感、熱感、 りんせつ らくせつ 鱗屑・落屑（フケ、アカのような皮ふのはがれ）、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮ふの亀裂、いたみ、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

*：全身に発現することがある。

3. 2週間位使用しても症状が良くならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日1回、適量を患部に噴霧してください。

【用法・用量に関する注意】

1. 定められた用法を厳守すること。
2. 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。
3. 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないこと。
4. **目に入らないように注意すること。**万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
5. よく振ってから使用すること。
6. 患部まで5cm位の距離で噴霧すること。なお、噴霧口をよく確かめ、顔面、特に目に向けて噴霧したり、吸入しないこと。

ラミシールプラスジェットのご使用方法

- 必ずノズルを下に向けて使用すること。



7. 同じ箇所に連続して1秒以上噴霧しないこと。
8. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
9. 外用にのみ使用すること。

成分 (原液100g中)

成分	分量	はたらき
テルビナフィン塩酸塩	1g	みずむし・たむしの原因である白癬菌にすぐれた殺真菌作用を示します。
クロタミトン	5g	患部のかゆみを鎮めます。
グリチルレチン酸	0.5g	患部の炎症を抑えます。
l-メントール	2g	患部のかゆみを鎮め、爽やかな使用感が残ります。

添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、ジソプロパノールアミン、エタノール、LPG

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
4. 使用期限をすぎた製品は使用しないこと。
5. 火気に近づけないこと。
6. 使用済みの容器は火中に投じないこと。
7. 本剤は合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料をとかしたりすることがあるので、床や家具等につかないようにすること。
8. 捨てるときは火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜くこと。

火気厳禁 プロピレングリコール、エタノール 15mL / 22.5mL

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ① 炎や火気の近くで使用しないこと。
- ② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④ 火の中に入れないこと。
- ⑤ 使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG

水虫治療のアドバイス

水虫・たむしの原因である白癬菌(水虫菌)は、症状があらわれている範囲より広く寄生していることが多いので、薬剤を広めに塗布することをお勧めします。また、以下のことに留意して使用してください。

1. 根気よく継続治療する

- かゆみなどの症状がなくなった後も、約1ヵ月間は、根気よく治療を続けてください。



2. 患部を清潔にする

- 白癬菌の増殖を抑え、二次感染を防ぐため、患部をよく洗い清潔に保ってください。
- 薬剤を塗布した後、患部にふれた手や指もしっかりと洗ってください。




3. 患部の乾燥に心がける

- 白癬菌はじめじめした環境を好みます。入浴あとや、スポーツなどで汗をかいたあとはしっかりと患部を乾燥させてください。
- 通気性の悪い靴・靴下はなるべく避け、患部を乾燥させるよう心がけてください。



4. 履き物なども清潔に

- 靴、靴下、スリッパ、浴室のマットなども清潔に保ち、感染に注意してください。
- 靴のむれは水虫の温床になります。数足を毎日順番にはきかえるよう心がけてください。



お問い合わせ先

製品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

ノバルティス ファーマ株式会社 〒106-8618 東京都港区西麻布4-17-30
お客様相談室 電話 **03 (5766) 2615**
受付時間 9:00~17:00
(土日祝・その他当社休業日を除く)

製品に関する情報はこちら <http://www.lamisil-at.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話: 0120-149-931 (フリーダイヤル)

 **NOVARTIS**

製造販売元

ノバルティス ファーマ株式会社
東京都港区西麻布4-17-30