

眼科用剤（分包品）

日本薬局方

第3類医薬品

# ホウ酸

Boric Acid

## 【使用上の注意】



注 意

### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 外用にのみ使用し、内服しないでください
2. 長期連用しないでください

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ |

## 【効 能 効 果】

結膜囊の洗浄・消毒

## 【用 法 用 量】

2 % 以下の濃度で用いてください。

### 〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (3) 混濁したものは使用しないでください。
- (4) 眼科用にのみ使用してください。
- (5) 完全に溶解させてから使用してください。

## 【成 分 分 量】

1 包中 日局ホウ酸 3g 含有。

## 【保管及び取扱

### い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 溶かした後は速やかに使用してください。

### 〈貯法〉

密閉容器。室温保存。

## 【希 釈 方 法】

2 % 液：本品 1 包（3g）をとり、水約150mL に溶かしてください。

外用剤なので飲まないでください

## 【包

### 装】

3g×18包



健栄製薬株式会社

大阪府中央区伏見町2丁目5番8号