

フストールシロップA

塩酸トリメキノール配合

1. 「たん」が出づらくて「せき」の出る方に

フストールシロップAは去痰剤としての性格が強く、「たん」を伴う「湿性のせき」に効力を発揮します。気管支筋に強い選択性を有する塩酸トリメキノール（気管支拡張剤）の配合により気道を確保し、塩化リゾチーム（消炎・タンパク分解酵素）により「たん」の粘度を低下させ、更に、舌咽神経を介して反射的に気道分泌を促し、「たん」の切れをよくするセネガを配合しています。

2. 「ぜんそく」又は「ぜんそく傾向」で、中枢性鎮咳剤を使えない方の「せき止め」に

気管支筋に強い選択性を有する塩酸トリメキノール（気管支拡張剤）の配合により気道を確保し、「せき」を軽減し、「ぜんそく」に基づく諸症状をやわらげます。
また、各種アレルギー性疾患の予防・治療に効果のあるマレイン酸クロルフェニラミンの配合によりアレルギー性の「せき」、「ぜんそく」に効果があります。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

- 次の人は服用しないでください。
本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気があらわれることがあります。）



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 (1) 医師の治療を受けている人
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 (3) 高齢者
 (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 (5) 薬により、アレルギー症状を起こしたことがある人
 (6) 次の症状のある人：高熱、排尿困難
 (7) 次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
 (8) 乳児（乳児において、本剤に含まれる塩化リゾチームを初めて服用した時に、ショック（アナフィラキシー）があらわれたとの報告がある。）
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜に現れる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

□のかわき

〔成分・分量〕 本品60mL中

塩酸トリメトキノール……………6mg 塩化リゾチーム…………… 60mg (力価)
マレイン酸クロルフェニラミン ……12mg セネガ流エキス…………… 1mL

添加物として、エデト酸Na、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、パラベン、安息香酸Na、香料、赤色102号を含有しています。

〔効能・効果〕

せき、ぜんそく、たん

〔用法・用量〕

下記の1回量を添付の計量コップにとり、1日4回毎食後及び就寝前に服用してください。
なお、場合によっては、約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用しても差し支えありません。

年 令	1 回 量
成 人 (15才以上)	10mL
11才以上～15才未満	6.6mL
8才以上～11才未満	5mL
5才以上～ 8才未満	3.3mL
3才以上～ 5才未満	2.5mL
1才以上～ 3才未満	2mL
3ヵ月以上～ 1才未満	1mL

- (1) 本剤は劇薬に該当する成分も含まれていますので、定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、止むを得ない場合の他は、服用させないでください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 計量コップは使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

〔包 装〕

120mL (計量コップ添付)

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金(祝・祭日を除く)
9:00～17:00