

医薬品を正しく購入するための **説 明 文 書** 使用前には必ず添付文書を読んで下さい

名称	オムニンエース
----	---------

第②類 医薬品

成分・分量	<p>1日量(9錠)中                  イブプロフェン 450mg, クレマスチンフマル酸塩 1.34mg(クレマスチンとして 1mg), ジヒドロコデインリン酸塩 22mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg, ブロムヘキシシン塩酸塩 12mg, 無水カフェイン 75mg,</p> <p>添加物として、セルロース、無水ケイ酸、クロスCMC-Na、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴールを含有しています。</p>
-------	---



用法・用量	<p>下記の1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。                  大人(15才以上) 3錠</p>
-------	---

効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
してはいけないこと	<p>1. 次の人は服用しないでください。                  (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人                  (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。                  他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります。)</p> <p>4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。</p> <p>4. 服用前後は飲酒しないでください。</p> <p>5. 5日間を超えて服用しないでください。</p>
次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください	<p>(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人                  (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人                  (3) 高齢者                  (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人                  (5) 次の症状のある人: 高熱、排尿困難                  (6) 次の診断を受けた人: 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合性組織病                  (7) 次の病気にかかったことのある人: 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病</p>
その他	
店名	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談ください。