

ご使用に際して、外箱の説明文を必ず
お読み下さい。また、必要な時に読める
よう商品と共に大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持
って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
(2) 次の症状があらわれることがあるので、このよう
な症状の継続又は増強が見られた場合には、
服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に
密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビンのフタの締め方が不十分な場合、湿気などの
影響で薬が変質することがありますので、服用の
つどビンのフタをよく締めて下さい。
- (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。

使用期限

製造番号

しみ、そばかす、日やけによる色素沈着

VITAMIN
C
CAPSULE



1カプセル中
日本薬局方ビタミンC
500mg

ビタミンCカプセル
「コバヤシ」

第3類医薬品 75カプセル

ビタミンCカプセル「コバヤシ」 第3類医薬品

【効 能】

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれ
による色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても
改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医
師に相談して下さい。」
- 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・
授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の量を、水又はぬるま湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1～2カプセル	1日2回
7才～14才	1カプセル	朝夕服用して下さい。
7才未満	服用しないで下さい。	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもと
に服用させて下さい。

【成分・分量】1カプセル中

アスコルビン酸(ビタミンC) ……500mg
添加物：トウモロコシデンプン、ゼラチン、ラウリル硫酸Na

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与える
ことがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを
含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。

製造販売元 小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鷗1丁目139番地
本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

お客様相談室 電話 058-278-3933
受付時間 10時から16時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931