

生薬エキス錠

糖解錠[®]

第2類医薬品

☆糖解錠は、10種類の生薬からなる生薬製剤で、血糖を穏やかに下げる働きがあります。

☆糖尿病による諸症状(口渴、頻尿、多尿)を改善します。

☆服用しやすい錠剤タイプです。



使用上の注意



相談すること

＊＊1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸の弱い人
- (4) 高齢者
- (5) 次の症状のある人
むくみ、食欲不振、吐き気・嘔吐
- (6) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病



＊＊2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐
その他	興奮、不眠、高血圧

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

＊＊3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢

＊＊4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

＊＊5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

糖尿病

用法・用量

次の量を、食前又は食間に、水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3～5錠	3～5回
15歳未満	服用しないこと	

服用時間を守りましょう。

食前：食事の30分～1時間前の空腹時を指します。

食間：食後2～3時間後の空腹時を指します。

<用法・用量に関する注意>

用法・用量を厳守してください。

成分・分量

120錠中に次の生薬より製したエキス35.0g含有しています。

成 分	分 量	成 分	分 量
バクモンドウ	12.0g	カロコン	12.0g
ニンジン	8.0g	ブクリョウ	12.0g
カッコン	12.0g	ゴミシ	6.0g
ジオウ	12.0g	カンゾウ	6.0g
チモ	10.0g	タラ根	10.0g

添加物としてセルロース、水酸化Al、ステアリン酸Mg、銅クロロフィリンNa、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、炭酸Ca、タルク、セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に

密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分です
と湿気などのため変質することがあります。また、本剤
をぬれた手で扱わないでください。



(5)ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。

開封後は不要となりますので取り除いてください。

(6)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。

(7)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。

(8)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

摩耶堂製薬株式会社 「くすりの相談室」

〒651-2142 神戸市西区ニツ屋1-2-15 電話 (078) 929-0112

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)

製造販売元



摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町居住65-1